


مؤسسة الإيمان





جمية حقوق الطبة محفوظه

٠٠١٥ - ٢٤١ه



إحصائيات هامة عن الأرمن

المجموعة الشمسية



الشمس إحدى نجوم درب التبَّان، يدور حولها تسعة كواكب ويعتقد العلماء أنها نشأت وكواكبها منذ ٤٦٠٠ مليون سنة.

موقع الأرض في الكون



بحرتنا واحدة من ٤٠٠ مليون مجرة في الكون، يدعى الجزء الصغير من مجرتنا والذي تراه في السماء درب التبَّان، إذ يحتوي على ٣٠٠ مليون نجم، إن كان كل نجم كهذه النقطة (.) فستكشل هذه النجوم خطأ يمتد من لندن إلى موسكو.

قيطر الأرض:

عند القطبين: ١٢٧١٣ كم

عند خط الاستواء: ١٢٧٥٦ كم

المحيط حول القطبين: ١٠٠٠٠ كم

حول خط الاستواء ٤٠٠٧٥ كم

الكثافة: ١٨٥,٥١٨ غ/ سم٣

الحجم: ۱۲۱۰×۱٬۰۸ کم۳

المساحة: ١٠٠٠، ٢٦٠٠١ كم٢

الوزن: ٦٠٠٠ مليون مليون مليون طن

إحصائيات عن الأرض



البقاع المائية من الأرض

يغطي الماء حوالي ٧٠٪ من سطح الأرض، ويتميز نصف الكرة الجنوبي بكمية أكبر من الماء مقارنة مع الشمالي، كما يعيش أكثر من ٨٠٪ من السكان شمال خط الاستواء.



جزر جديدة

لا تزال تتشكل جزر جديدة بسبب البراكين التي تتفجر تحت البحر، فقد ظهرت جزيرة سيرتسي في البحر قرب ساحل إيسلندا عام ١٩٦٣، أما أحدث جزيرة ظهوراً هي جزيرة لاتيكي قرب الساحل الشرقي لأستراليا التي اكتشفت للمرة الأولى عام ١٩٧٩.



في باطن الأرض

سطح الأرض عبارة عن قشرة صخرية رقيقة، يعتقد العلماء أن تحت هذه القشرة طبقة من الصخور المصهورة تدعى الغلاف تحيط بمركز الأرض المكون من الحديد والنيكل المصهورين، أما مركز الأرض ذاته فهو كرة صلبة من الحديد والنيكل.



أكبر الجزر مساحة

الجزيرة	المساحة بالكيومتر المربع
غرين لاند	7170
نيو جينوى	VA99
بورنيو	٧٥١
مدغشقر	٥٨٧٠٠٠
بافّان	0.75
سومطرة	٤٢٢٢
هونشو	77
بريطانيا العظمى	1877
فيكتوريا	7177
إلسمر	1977

القارة
آسیا
أفريقيا
أمريكا الشمالية
أميريكا الجنوبية
أستراليا
أوربا
أوقيانوسيا

أبعد الجزر

يعيش ٢٩٩ نسمة على جزيرة ترستان داكونها في المحيط الأطلسي، وهي الجزيرة الأكثر عزلة عن العالم والمأهولة بالسكان، وتبعد أقرب جزيرة إليها جزيرة سانت هيلينا مسافة ٢١٢٠ كم.

وتعدُّ بوفيا أويا في جنوب المحيط الأطلسي من أكثر الجزر الخالية المعزولة في العالم، تبعد عن ساحل القارة القطبية الجنوبية الشرقي ١٧٠٠ كم.



كروية الأرض



لا تعد الأرض كروية الشكل بل في الحقيقة منبسطة قليلاً من الأعلى والأسفل، والقطر بمن القطبين أقصر منه كم.

هل تعلم؟

أن أكبر المحيطات هو المحيط الهادي وتبلغ مساحته ثلاثة أضعاف مساحة آسيا التي تعد أكبر القارات.



قمر الأرض



تعد الأرض ثالث أقرب الكواكب إلى الشمس، يدور حولها قمر طبيعي واحد وهو القمر الذي يبعد عن الأرض ٣٨٤٣٦٥ كم (٢٣٨٨٤٠)، يبلغ حجم القمر ربع حجم الأرض.

	ن باطن الأرض	إمهائيات عد	
الحرارة	الطبقة	العمق بالكيلومترات	الطبقة
۱ ۲ در جه منویه و سطیه ۱ ۰ ۰ ۱ ۵ ۰ ۰ ۳۰ د. مئویه ۱ ۰ ۰ ۹ ۲ در جة مئویة	القشرة الغطاء القلب الخارجي القلب الداخلي	۸ ٤٠ ٢٨٧٠ ٢١٠٠ نصف القطر	القشرة تحت البحر القشرة تحت اليابسة الغطاء القلب الخارجي القلب الداخلي

تاريخ الأرض

في البداية



يعتقد العلماء أن الأرض تشكلت منذ حوالي ٤٦٠٠ مليون سنة من غيمة مكونة من الغاز والغبار تدور دوراناً سريعاً، ثم تقلصت وأصبحت كرة حارة مصهورة، تشكلت قشرة صخرية على السطح وهي تبرد، و أقدم صخور الأرض موجودة في غرب غرين لاند، ويبلغ عمرها ٣٨٢٠ مليون عام.

منشار المنحنيات



ليست القشرة الأرضية قطعة صلبة واحدة، فهي متشققة على شكل منشار المنحنيات إلى سبع قطع كبيرة والعديد من القطع الأصغر، تدعى هذه الأجزاء صفائح وتبلغ تخانة إحداها (٤٦) كم تقريباً، تطفو هذه الصفائح على صخرة الغلاف السائلة والحارة، هذه الطبقة العميقة واقعة تحت القشرة الأرضية.

ارتطام وسعق



بقيت أجزاء القشرة المتشققة في ارتفاع فوق سطح الأرض ملايين السنين، حيث ارتطمت الصفائح وتصادمت وتغضنت القشرة مشكلة حفراً عميقة في أرض البحر وصخوراً راسيات مرتفعة تشكل جبالاً على اليابسة، لا تزال بعض مناطق اليابسة في ارتفاع مستمر فقد ارتفعت هضبة التيبت ٣ كم في المليوني سنة الأخيرين.

انزلاق الصفائح بعيدأ



يمكن للصفائح أن تنزلق مبتعدة عن بعضها على الأرض وتحت البحر، والصدع الواقع في ساق أندرياس في الولايات المتحدة الأمريكية هو عبارة عن حد بين صفيحتين، وهو صدع عظيم يبعد ١١٢٦ كم عن خليج كاليفورنيا، وخلال ١٥ مليون عام انتقلت كاليفورنيا حوالي ٣٠٠ كم نحو الشمال وقد تنشق وتتلاشى خلال ٥٠ مليون عام أخر .

القشرة المتغيرة



تتكون قشرة جديدة طيلة الوقت علىقاع البحر، وترتقع فقاعات صخرية سائلة وحارة خلال الشقوق العظيمة الواقعة بين الصفائح، مثال على هذه الحالة سلسلة التلال الواقعة في وسط المحيط الأطلسي، فيمكن أن يتشكل ما قد يصل إلى ١٠ سم من الصخرة الجديدة كل سنة على كلاطرفي الصدع، توجد مجموعة مرتفعات في القاع قريبة من سطح منطقة أيسلندا وتمتد هذه الجزيرة ببطء شديد حيث تنفصل الصخور السائلة عن الصخور العظيمة التي تسير عبر الجزيرة. في أماكن أخرى من أرض البحر تنزلق الصفائح فوق بعضها، يؤدي هذا إلى سقوط بعض أجزاء القشرة إلى أعماق تضاريس البحر، مثال على هذه الحالة خندق بيروتشايل في المحيط الهادي، حيث يرجع هذا الخندق ليصل إلى طبقة الغلاف الحارة.



الانجراف القاري

يعني انجراف القشرة الأرضية أن القارات لم تثبت في مكان واحد بشكل دائم، فقد كانت أفريقيا الشمالية في زمن من الأزمان مغطاة بطبقة من الجليد وكانت تقع حيث يقع القطب الجنوبي اليوم، وكان القطب الجنوبي اليوم، وكان القطب الجنوبي في السابق مغطى بالغابات.



منذ حوالي ٢٠٠ مليون عام كانت معظم مناطق اليابسة متصلة مكونةً قارة كبيرة جداً كانت تدعى "بانجايا"، انقسمت هذه القارة إلى اثنتين لوراسيا ومعظمها الآن في نصف الكرة الشمالي وغوندوانالاند ومعظمها الآن في نصف في نصف الكرة الجنوبي.



لا تزال القارات تتحرك حتى الآن، فقد تربط ألاسكا والاتحاد السوفييتي خلال . ٥ مليون عام.




تا كل الأرض



الجميع يغيثرون

هد ساهم السكان أيضا في تغيير معالم الأرض، عقد قطعوا أشجار الغابات وقوموا الأنهار وبنوا مصاطب على جانبي الهضاب المنحدرة لزراعتها، كما اقتلعوا الصخور واستخلصوا المعادن والمواد الخام من الأرض.

يمثل منجم النحاس في بنغام في أمريكا حفرة ضخمة قطرها ٣,٧ كم وعمقها ٩ ٧٨م، أوجد الناس أيضاً أرضاً جديدة بعد أن ادعوا ملكية أراض من البحر تبلغ مساحتها ثلث مساحة الأرض الزراعية في نيذر لاندز.



جو الأرض

الأُوكسجين. الهواء الذي نتنفسه



تشكل الأوكسجين للمرة الأولى منذ حوالي د ٢٠٠٠ مليون عام فقط عندما بدأت نباتات الأشنات بالظهور على الأرض، تطلق النباتات الأوكسجين تحت ضوء الشمس فتتنفسه الحيوانات والإنسان، تطرح جميع الحيوانات غاز ثاني أوكسيد الكربون الذي تتنفسه النباتات.

تناقص الهواء بالارتفاع



كلما ازداد ارتفاعنا في الجو، قلّت كثافة الهواء، ولهذا السبب يحتاج سكان الجبال قدراً أكبر من الأوكسجين، تبلغ كثافة الهواء على قمة إفيريست ثلث كثافته عند مستوى سطح البحر.

خارج الأرض



الأرض محاطة بغلاف من الهواء يدعى الغلاف الجوي الذي ينقسم إلى طبقات مختلفة؛ أعلاها تبعد عن الأرض ٨٠٠٠ كم.

في البداية



كان جو الأرض في الأصل عبارة عن مزيج بخاري حار من الغازات كالميتان والنيتروجين والهيدروجين وثاني أوكسيد الكربون إضافة إلى بخار الماء.

هل تعلم؟

أن في الجو ماءً، لو سقط على شكل أمطار في وقت واحد، لغطى سطح الأرض كاملاً بعمق ٢,٥ سم.

الارتفاعات الجوية

الطقة

الطبقة الخارجية إكسوسفير ٥٠٠ ـ ٥٠٠ كم الطبقة الحرارية (ثيرموسفير) ٥٠ ـ ٥٠٠ كم الطبقة المتوسطة (ميسوسفير) ٥٠ ـ ٥٠ كم الطبقة العليا (ستراتوسفير) ١٥ ـ ٥٠ كم الطبقة السفلي (تروبوسفير) ارتفاعها فوق سطح الأرض فوق خط الاستواء ٢١ كم فوق القطبين ٨ كم

الأمواج الترددية



تتحرك الإشارات الإشعاعية بسرعة الضوء، فتقطع ٣٠٠٠٠ كم في الثانية، ويمكن للإشارات أن تنتقل حول الأرض في مسار منحن عن طريق تردد الهواء المشحون بالإلكترونات في الطبقة المتوسطة والحرارية.

الطيران عاليا



تتألف الطبقة السفلي من الغلاف الجوي من العواصف والرياح والغيوم، وتطير الطائرات فوق طبقات الجو أي في الطبقة العليا، حيث تستخدم التيارات الهوائية التي يمكن أن تهب معظم التيارات المنبثقة من الغرب إلى الشرق.

رم يتألف الغلاف الجوي المعتقد أن الطبقة العليا الإكسوسفير معظمها مؤلف من الهليوم والهيدروجين والأوكسجين

أما الطبقة السفلي فهي مولفة من: النسبة المئوية الغاز 10001 النيتر وجين الأوكسجين 74.10 1641 الأرغون ثاني أوكسيد الكربون ٢٠،٠ . . . 7 النيون . . . 7 الهليوم . . . 7 کریبتو ن . . . 7 الهيدروجين . . . 7 الزينون . . . 7 الأوزون ضافة إلى بخار الماء وجزيئات مجهرية



بن الغبار و أبواغ نباتية وحبات من

ارتفاع الغبار



يمكن لانفجار بركان ضخم إطلاق الغبار والرماد إلى طبقة الجو العليا، ويمكن للغبار والرماد أن يدور حول الأرض تقريباً إذ يحتاج حوالي ثلاث سنوات كي يهبط إلى الأرض ثانية.

درجات مرارة الغلاف الجوي

درَجة الحرارة ٢٢٠٠ رجة مئوية الحد الأدنى - ٨٠ إلى ٢٢٠٠ درجة مئوية ١١ إلى - ٨٠ درجة مئوية

ـ ٥٥ إلى ١٠ درجة مئوية

٥٥در جة مئوية ١٥در جة مئوية الطبقة الخارجية الطبقة الخرارية الطبقة الحرارية الطبقة المتوسطة الطبقة العليا الطبقة السفلي (بارتفاع ١٦ كم)

مجاب الشمس

تشتمل الطبقة العليا من الغلاف الجوي التي تقع على بعد ٢٤ كم من الأرض على طبقة الأوزون، تعمل هذه الطبقة على تصفية أشعة الشمس من الأشعة فوق البنفسجية الضارة فلولا طبقة الأوزون لما كانت الحياة ممكنة على الأرض.



قوة الجاذبية


يرتبط الغلاف الجوي بالأرض بقوة الجاذبية، فعلى الرائد الفضائي أن يقطع من الغلاف الجوي مسافة تتجاوز ٢٧٣٦٠ كم في الساعة ليتحرر من جاذبية الأرض.



	مسافة الارتفاع فوق الأرض	سجل الارتفاعات
	٥٢ کم	منطاد بلا ركاب
	۳۸ کم	الطائرة الحربية ميغ ٢٥
	۳۵ کم	منطاد يحمل ركاباً
The state of the s	۱۸ کم	طائرة كونكورد
E	۱۲ کم	طائرة نفاثة جمبو ٧٤٧
~ -	۸کم	طائرة دي سي ٩
	ما الفي ما الأنه ك	مَا مَا مَا مَا مَا مُا مُا مُا مُا مُا مُا مُا مُا مُا مُ

الأرض المرتفعة

يرتفع حوالي ٢٥٪ من الأرض عن مستوى سطح البحر مقدار ١٤ ٩ م أو أكثر، من بين هذه الارتفاعات هنالك القارة القطبية الجنوبية التي ترتفع عن مستوى سطح البحر حوالي ١٨٢٩م، أما ارتفاع هضبة التيبت الوسطى فهو ٧٧٥٤م.



العاصمة الأعجوبة

هل تعلم أن أكثر المدن ارتفاعاً في العالم هي العاصمة لاباز في بوليفيا الذي يبلغ ٢٥ ٣٦ م، تقع هذه المدينة على جبال الأنديز.



الحادور

يمكن لضربة قوية لباب السيارة أو سقوط غصن أو حركة المتزلج أن تؤدي إلى انحدار كتلة ثلجية وهذا ما يسمى الحادور، ينحدر الجليد بسرعة ٣٢٢ كم/سا.



العيش في الأعالي

تتناقص كمية الأوكسجين كلما ارتفعنا أكثر عن مستوى سطح البحر، ويستطيع سكان الجبال وحيواناتهم أن يعيشوا في ارتفاعات شاهقة لأن قلوبهم ورئاتهم أكبر من قلوب ورئات غيرهم، ولهذا تستطيع إحتواء قدر أكبر من الدم وبالتالي من الأوكسجين، يعيش هنود كويكوا على جبال الأنديز التي يبلغ ارتفاعها ٠ ٣٦٥ م، ويزرعون فيها البطاطا والذرة ويرعون الأغنام.



	، حسب قاراتها	أعلى الجال	
االارتقاع	الجبل	الموقع	القارة
٨٨٤٨م	إيفيريست	نيبال/ التيبت	آسيا
٥٩٨٥م	كيليمانجارو	تنزانيا	أفريقيا
27195	مكينلي	ألاسكا	أميركا الشمالية
٠ ٢٩٦٠	أكونكآغوا	الأرجنتين	أميركا الجنوبية
,3109	فينسون ما سيف	أرض إلسورث	القطبية الجنوبية
٠ ١٨٤ م	مونت بلانك	فرنسا	أوربا الغربية
77709	إلبرس	الاتحاد السوفييتي	أوربا الشرقية
37779	كوك	نيوزيلاندا	أوقيانوسيا



يستطيع الناس والحيوانات والنبات أن يعيشوا في المرتفعاتالجبلية، يبين لك هذا الجدول بعض مظاهر الحياة في جبال هيمالايا.

نمر الثلج

يأخذ سكان التيبت ثيرانهم إلى ما قد يصل ارتفاعه ٢٠٠٠ م لترعى في الصيف.

الخشخاش الأزرق

النعجة الزرقاء

الدب الأسود الأسيوى

111.

مَهِّد سكان التيبت المنحدرات المنخفضة ليزرعوا فيها مزروعاتهم.

أشكال الحال

الغابات ألوردية

كلما ازداد عمر الجبال تغير شكلها، إذ يؤدي الصقيع والجليد إلى تشقق الصخور وحتّها ويعتقد العلماء أن الجبال تفقد ٨,٦ سم من الصخور كل ١٠٠٠ عام.



متسلقات المنعدرات الهخرية

يستطيع ماعز الجبال تسلق صخور عمودية يمكِّنها من هذا التسلِّق لِبْدُ القدم الخشن الذي يمنعها من الانزلاق على الصخور المنحدرة.



أطول السلاسل الجبلية

الطول	الموقع	السلسلة
۰ ۲۲۶ کم	أميركا الجنوبية	الأنديز
،۳۰۲ کم	أميركا الشمالية	روکی
٠ ٢٨٦ کم	رش آسیا	هيمالايا / كاراكورام/ هيندوكو
۲۲۲۰ کم	أستراليا	السلسلة القاسمة الكبرى
. ۲۵٤ کم	القارة القطبية الجنوبية	عابرة القارة القطبية الجنوبية
عالان مأة اة	الأدر أما المار ال	11 -1 1 1 1 1

يبلغ طول سلسلة جبال الانديز اطول من ضعفي عرض قاره امريكا الشمالية.

هل تعلم؟

وجدت بعض الأصداف البحرية على صخور جبال عالية، كجبال أبينينيس في إيطاليا، كانت هذه الصخور في القدم في قعر البحر فاندفعت إلى الأعلى عبر ملايين السنين أثناء جفاف القشرة الأرضية.



مناخ الجبال

تتناسب درجة الحرارة في الجبال تناسباً عكسياً، فتهبط الحرارة درجتين كلما صعدنا إلى الجبل بإرتفاع ٠٠٠م، ولا تتجاوز درجة الحرارة (د ٢٠ م) في قمة جبال الهيمالايا حيث يمكن أن تقطع الريح الشديدة أكثر من حيث يمكن أن تقطع الريح الشديدة أكثر من ٢٠٠م/سا.



أعمار الجيال

يبلغ عمر السلاسل الجبلية ملايين السنين، إلا أنها ليست من عمر واحد، وقد توصل العلماء إلى عمر تقريبي للسلاسل الجبلية، وإليك بعض الأمثلة.

		0 0
العمر بملايين السنين	الموقع	الجبل
٤٠٠	سكو تلندا	های لاند
70.	الولايات المتحدة الأمريكية	أبالأكيان
70.	الاتحاد السوفييتي	الأورال
٨٠	أميريكا الجنوبية	الأنديز
٧.	أميريكا الشمالية	روکی
٤٠	آسيا	الهيمالايا
10	أوربا	الأل

mest thing

فجر المنطقة الشمالية

يسطع الضياء الطيفي في منطقة الشفق القطبي الشمالي ويتوهج عالياً في الجو أقصى الشمال، وتتحرك في السماء سحب من الضياء في فصل الشتاء.

منظر من الطبيعة المبكرة

يهطل في التندرا حوالي ٢٠ سم من المطر فقط في السنة، وتؤدي طبقة الجليد الدائمة إلى منع الماء من التسرب ولذلك تجد معظم منطقة التندرا متميزة بوجود السبخاب والبحيرات الضحلة، ولا يذوب من التندرا إلا بضعة سنتمترات كل صيف.

تمتد مروج التندرا المتجمدة بين خط من الأشجار (أي السطرف الشمالي من الأراضي الغابية) والمنطقة مساحتها (١,٥) من مساحة البرازيل، وتمثل من اليابسة بعد ضم شمال كنندا والنروج والسويد وفنلندا وغرين لاند وسيبريا وألاسكا وآيسلندا.

المروج المتجمدة



إمهائيات التندرا

مساحة منطقة التندرا عمق طبقة الجليد الدائمة درجة الحرارة في الشتاء درجةالحرارة في الصيف

۱۳۰۰۰۰۰ کم۲ ۳۰۵- ۲۱۰ م من-۲۹ إلی -۳۲ درجة مئوية ۳إلی۱۲ درجة مئوية

سكان التندرا

يعيش حوالي ٩٠٠٠٠ من سكان الأسكيمو في منطقة التندرا، وقد بنيت مساكن معظمهم من الخشب أما في غرين لاند وكندا فلا يزال بعض السكان يعيشون في أكواخ قبية الشكل، يسكن التندرا أيضاً ٢٠٠٠٠ من الياكوت في سيبيريا و ٢٠٠٠٠ من اللابيين في اسكندينافيا.



أبرد من الثلج

تصبح درجة حرارة التندرا شتاءً شمال شرق سيبيريا، تحت غطائها الجليدي والثلجي -٧٠، أي أبرد من الحرارة في القطب المتجمد الشمالي.

الحياة تحت الجليد

يمكنك أن تمشي على غابات التندرا، فالأشجار هناك لا تورق نتيجة للبرد والرياح الجافة، و تنمو قريبة من الأرض، قد يصل طول أغصان الصفصاف الأرضي خمسة أمتار إلا أنه لا يظهر منها على سطح الأرض أكثر من ١٠ سم.

أيِّل الرَّنَّة الرمالة

ترحل قطعان أيّل الرَّنَة التي يبلغ عدد أحدها ، رأس قاطعة مسافة . . . كم شمالاً نحو التندراكل ربيع حيث تولد صغارها هناك، وفي أواخر الصيف تعود إلى الجنوب متخذة طرقاً يرجع تاريخها إلى قرون عديدة.



استطاع العلماء أن يعيدوا الإنبات إلى بذرة عمرها ١٠٠٠ عام، فقد وجدت هذه البذرة وهي بذرة الترمس القطبية الشمالية في يوكون في كندا.



الجليد الدائم

تبقى طبقة الجليد الدائم أي الطبقة العميقة من الأرض الواقعة تحت التندرا متجمدة طيلة السنة، قيست تخانة هذه الطبقة في سيبيريا فوجدت ١٥٠٠م.



طنين الناموس

عندما يصبح الجو صافياً ساكناً دافئاً في فصل الصيف القصير تغزوالناموس التندراوتتكاثر أنواع أخرى من الذباب، يتميز الذباب النبري بضرره الشديد لدرجة أنه يمكن أن يسبب الجنون لبعض قطعان الكاريبو.



هل تعلم؟



هل تعلم أن أنابيب النفظ العابرة إلى آلاسكا تمتد ١٣٠٠ كم من المحيط المتجمد الشمالي إلى جنوب آلاسكا، ويُسخّن النفط حتى ٤° م كيلا يتجمد داخل الأنابيب.

البياض في الشتاء

تبدل كثير من الطيور والحيوانات التي تعيش في التندرا طيلة العام لونها وفقاً لكل فصل، ففي الخريف يتغير لونها إلى الأبيض ليماثل لون الثلج، وفي الربيع تعود ألوانها كما كانت لتناسب الألوان الصيفية.



الثلاّجة

يمكن لطبقة الجليد الدائم أن تعمل عمل الثلاجة، فقد وجدت في سيبيريا أجساد فيلة الماموت التي يرجع عمرها إلى عصر الجليد، وجد أيضاً عام ١٩٨٣ حشمان حون تورينجتون؛ الموظف البحري البريطاني الذي مات عام ١٨٤٥ أثناء بعثته إلى مضيق البيرنغ.



الغابات

إمهائيات عن الغابات

تمتد أشجار الصنوبر في شمال قارة أوربا وآسيا عرضاً وشمال قارة أمريكا، كما توجد في المناطق الجبلية مثل جبال روكي والألب والأورال، وتوجد غابات الأشجار عريضة الأوراق دائمة الخضرة مع غابات الأشجار المختلطة الأنواع على الأغلب في أوروبا الوسطى والغربية وفي شرق الولايات المتحدة الأمريكية وغابات متفرقة في اليابان والصين ونيوزلندة.

قائمة أنواع الأشجار في الغابات المتنوعة

نوع الشجر

الأشجار الصنوبرية

أشجار عريضة الأوراق وأشجار الصنوبر أشجار سنوية الإيراق عريضة الأوراق

أشجار عريضة الأوراق دائمة الخضرة

نوع الغابة

غابة الصنوبر

الغابة المختلطة

غابات دائمة الخضرة

غابات الأمطار الاستوائية

وتحوي غابات الأمطار الاستوائية على جميع أنواع الأشجار في الغابات السابقة.

أشجار ضد النار



بمقدور النار حرق غابات بسرعة تصل معدلها إلى (١,٥) كم في الساعة، كما يمكن سماع صوت ألسنة لهيب النار من بعد (١,٦) كم، وتعد الأشجار المحمية بطبقة سميكة من اللحاء مثل شجرة الأناناس وشجرة السكوية هي الأنواع الوحيدة التي تنجو من خطر النار إذ يبقى خشبها سليماً دون أضرار

أنواع أشجار الغابات عريضة الأوراق سنوية الإيراق

البلوط الزان شجرة الدردار

الكستناء الحلو

شجرة القضبان

شجر القيقب

شجرة البق

شجر جار الماء

ثمرة الصنوبر العمالةة تنمو أكبر ثمرة صنوبر على شجرة الصنوبر السكري في الولايات المتحدة الأمريكية، يصل طولها إلى (٦٦) سم أي ما يعادل طول ثلاثة أرباع مضرب لعبة البيسيول.





تاجر الأخشاب.

تزود الأشجار الصنوبرية بثلاثة أرباع الخشب المستهلك في العالم بالإضافة إلى أنواع الورق المستعمل جميعه تقريباً ، يتم إنتاج (٢٧٠) نسخة من كتاب مؤلف من (١٩٠) ورقة من شجرة صنوبر واحدة.



الأشجار عريضة الأوراق

لهذه الأشجار أزهار وأورارق عريضة ومنبسطة، بعض هذه الأشجار تطرح أوراقها سنوياً كل خريف، وبعضها الآخر دائم الإيراق، تنمو أشجار الغابات عريضة الأوراق وسنوية الإيراق في المناخ الدافئ والمعتدل، بينما تنمو أشجار الغابات دائمة

الخضرة في المناخ الــــرطب والحار عـلى مدار السنة.

مقائق مدهشة

يستهلك كل شخص في أمريكا سنوياً أشياء مصنوعة من الخشب تعادل شجرة طولها (٣٠) متراً وقطرها (٤١) سم، أي هناك مجموع قدره (٢٣٠) مليون شجرة للاستعمال سنوياً.

غابات الصنوبر

تنتج أشجار الصنوبر ثماراً وأوراقاً إبرية معظمها دائم الخضرة، إلا أن بعضها الآخر كشجر الشربين، يفقد أوراقه الإبرية في الخريف، وتنموأشجار الصنوبر في أجواء باردة في أقاصي الشمال وفي أعالي الجبال حتى جبال المناطق الاستوائية.



الجذور العميقة

يصل طول الأشجار القارية من فصيلة الجوزية إلى ٣٧ متراً؛ كما يصل الجذر الأصلي إلى ٣٠ متراً أي ما يعادل طوله طول الشجرة تقريباً.



مجموعة منتجات من أشجار الصنوبر



أجزاء الشجرة بعض استعمالاتها الخشب للأثاث ـ الكبريت عجينة الورق الورق ـ البلاستيك ـ الحرير الصناعي الصناعي السيللوز مادة السلفان ـ زيت التربنتين

الأوراق الإبرية زيت ورق الصنوبر (المستعمل في صناعة الصابون) في تامين (أ) و(ج)




الأراضى الحراجية

تظهر براعم أزهار الأرض الحراجية في الربيع في الربيع في قبل ظهور الورق على الشجر وقبل أن تحجب عنها ضوء الشمس، وعندما تسقط الأوراق في فصل الخريف على الأرض تتعفن مشكّلة مادة الدّبال التي تزيد من خصوبة التربة.



أطول وأقدم وأكبر

تحوي غابات الجبال شمال غرب قارة أمريكا أكبر وأقدم وأطول الأشجار على الأرض،



يبلغ عمر أشجار الصنوبر (ذات الثمرة الشوكية) حوالي (٥٠٠٠) سنة تقريباً وهي بعمر أهرامات مصر، ويبلغ عرض أشجار السكوية العملاقة إلى (٧,٦) م وهو عرض يكفي لأن تمر سيارة من خلاله. كما يصل طول أشجار الخشب الأحمر إلى (١٠٧) م ويمثل طول أربع أشجار من هذا النوع طول برج "سيرز ريبك" أطول مبنى في العالم.

غابات بلا أشجار

تنمو غابات ضخمة من نبات الخيزران الذي يبلغ طول ساقه أكثر من (١٨) متراً في أعالي الجبال الغربية في الصين حيث يعيش الباندا العملاق، ومن المعروف أن نبات الخيزران ليس من أنواع الشجر بل هو نوع من الأعشاب النامية في الحقول إلى ١٠٠ سم فقط.



الضفادع الطائرة

تستطيع ضفادع الشجر الآسيوية والتي طولها (١٠) سم الطيران من شجرة إلى أخرى بمسافة تصل إلى (١٢) متراً، وتعمل الأغشية التي تصل بين أصابعه عمل المنطاد عند هبوطه.



الغابات الإستوائية المدارية

تغطي غابات الأمطار حوالي ٦٪ من سطح الأرض، وقد نمت هذه الغابات منذ مئات المملايين من السنين في النروج، ويقع معظمها اليوم على خط الاستواء أو في شماله حيث توجد هذه الغابات مثلاً في نيوجينوى وماليزيا وفي بعض المناطق الأفريقية كما توجد في بورما وأندونيسيا وجنوب أميركا.



طبقات الأرض في الغابات الإستوائية

تنمو الأشجار والنباتات في الغابات الاستوائية فتصير بأطوال مختلفة، يمكن تقسيم الغابة من حيث طول نباتاتها إلى خمسة أقسام:

الطول	نوع النبات
تصل إلى ٩١م	الأتيك
من ۲۱ ـ ۲۲م	شجر الظلة
من ٦ - ١٢ م	شجر ما دون الظلة
من ۶٫۰۰۲م	شجر الجنبة
يصل إلى ٦٠,٠م	الأعشاب

مقائن مدهشة



يعيش كنغر الأشجار في غابات "نيوجينوى"، حيث يقضي معظم الوقت على الأشجار ومن الدهشة بمكان أن بمقدوره القفز إلى أرض الغابة من علو يبلغ (١٨) متراً، ولهذا الكنغر ذيل أطول من جسمه يساعده على التوازن أثناء القفز.

النباتات المنتهبة

تنمو النباتات المنتصبة على الأشجار الطويلة الشاهقة نحو السماء، حيث تستمد الغذاء والماء من الجو؛ وتمثل النباتات كالأناناس البري مسكناً آمناً للحشرات والضفادع يرتفع سبعين متراً عن أرض الغابة.



منتجات الغابات الإستوائيقة



تدخل منتجات تربة هذه الغابات في معظم محاصيلنا ومصنوعاتنا، إذ تزودنا أشجار غابات الأمطار بالمطاط و"اللكّر" والصمغ والشمع والصبغ وإليك بعض الأمثلة:

الخشب خشب شجرة الهند الفاكهة شجر الموز - شجر الأناناس التوابل الفلفل الأحمر - الفلفل الأسود

الزيوت زيت التمر - خُضيرة النسيج الجوت - خيزران حبوب القهوة - الكاكاو



يعيش في غابات أمريكا الجنوبية أبطأ ثديي بري الجنوبية أبطأ ثديي بري على الإطلاق، إذ يقضي الدب الكسلان معظم وقته معلقاً من أعلى الأشجار، وعندما ينتقل من مكانه يزحف على ذلك الغصن ببطء شديد فتبلغ سرعته (٢٦) في فتبلغ سرعته (٢٦) في

مهنع الأدوية

تصنع بعض الأدوية من أشجار الغابات الإستوائية إذ تستمد مادتا الكينين والأسبرين من لحاء الشجر ومزيج شراب السعال من عرق الشجر.



الأمطار اليومية

يهطل المطر تقريباً كل يوم في الغابات الإستوائية ويبلغ معدل كمية الأمطار الهاطلة ما بين (٢٣٠) سم سنوياً، ونادراً ما تنخفض درجة الحرارة إلى ما دون (٢٦,٦) درجة مئوية، ويبلغ معدل رطوبة الجو (٨٠) بالمئة.



المياة في الغابات الإستوائية

يصل فقط (١) بالمئة من ضوء الشمس إلى الأرض في الغابات الإستوائية، وهكذا يتوجب على معظم الحشرات والطيور والحيوانات العيش فوق أشجار "الظلة" حيث يتوفر ضوء الشمس والغذاء.

الغابات العملاقة

تنمو نباتات عملاقة في الغابات على جبل كينيا فيصل طولها إلى ٣٠٠م حيث الأشجار مغطاة



حبال من الأغهان

تتدلى حبال من الأغصان من أشجار الظلّة في الغابات الإستوائية، وقد يبلغ قطرها (٦٠) سم وطولها (٢٥) متراً وهي حبال متينة بقدر يمكن الإمساك بها والتأرجح عليها.



نباتات للمأوى

تنمو نباتات "البريتشنغ" عالياً على أشجار الظلّة حيث تتمكن هذه النباتات من امتصاص الغذاء والماء من الهواء، ويمكن لنبات مثل الأناناس البري تزويد الحشرات والضفادع بمأوى مناسب، إذ يبلغ ارتفاعه عن الأرض أكثر من سبعين متراً.

هل تعلم؟

هل تعلم عزيزي القارئ - أنه حوالي (٢٥٠٠) مليون إنسان؛ أي ما يعادل نصف سكان العالم يستخدمون الخشب للطهي والتدفئة؟!



الأنهار والبحيرات

قطرة ماء

فقط (٣) بالمئة من المياه الموجودة في الكرة الأرضية هي مياه عذبة، وبقية الكمية مياه مالحة، ومن هذه الكمية العذبة الد (٣) بالمئة أكثر من ٢ بالمئة منها هي مياه متجمدة على شكل جليد وهكذا يبقى أقل من (١) بالمئة موجودة في البحيرات والأنهار وفي باطن الأرض.




أعمق بميرة

يبلغ طول بحيرة "بيكل" في روسيا (٢٤٤) كم وعرضها (٤٨) كم، وهي بحيرة عميقة جداً حيث يتراوح عمقها ما بين (١٦٢٠ - ١٩٤٠) متراً هذا العمق يكفي لأن تملأه جميع البحيرات العظمى الخمسة الموجودة في شمال أفريقيا.




	لار بالنسبة للقارات	أطول الأنت	
الطول	النهر	البلد	القارة
، ۲۰۰ کم	يانغتسى	الصين	آسيا
٠٧٦٢ کم	النيل	مصر	أفريقيا
، ۲۰۲ کم	الميسيسبي (ميسوري)	الولايات المتحدة	أمريكا الشمالية
٦٤٣٧ کم	الأمازون "	البرازيل	أمريكا الجنوبية
۳٦٨٨ كم	فولغا	روسيا	أوروبا الشرقية
۱۳۲۰ کم	الراين	ألمانيا	أوروبا الغربية
۲۷۲۰ کم	موري (دارلنغ)	أستراليا	أستراليا
تجري بعض هذه الأنهار في أكثر من دولة والقسم الأعظم منه في الدولة التي أتبع معها.			



نياكارا

تقع شلالات نياكارا في الوسط على طول نهر نياكارا الذي يتدفق بين بحيرتي "أونتاريو" و "إيراي"، يعود تاريخ هذه الشلالات قبل د ١٠٠٠ سنة أي في نهاية العصر الجليدي، منذ ذلك الوقت كانت الزيادة في العمق ١١ كم وقد انحدرت المياه بقوة على الصخور التي سببت حت صخور حافة الشلالات، وفي غضون ٢٥٠٠ سنة ستختفي شلالات نياكارا عند وصولها إلى بحيرة "إيراي" وقد تجف البحيرة تدريجياً.







هل تعلم؟

أنه ليس جميع الأنهار تصب في المحيطات، إذ تتباطأ الأنهار المتدفقة إلى الجنوب من أعالي جبال "تاسيلي" في شمال أفريقيا ليتضاءل حجمها إلى خيط من الماء ثم تختفي في رمال الصحراء الكبرى الجافة.



أكثر الشلالات ارتفاعاً



مقائق مدهشة

"الضاري" هي أسماك مفترسة آكلة لحوم، يستعمل هنود الأمازون أسنانها الحادة جداً كمقصات للقص والقطع.



الشلال المزدمم

يبلغ عرض شلالات "إيغزازو" في البرازيل (٤) كم وارتفاعها (٨٠) م، وخلال الفُصول الماطرة من تشرين الثاني إلى آذار تبلغ كمية الماء التي تصب على الشلالات كل ثانية حوالي ستة برك للسباحة من برك الألعاب الأولمسة.



أكبر البعيرات والبعار

تحوي معظم البحيرات على ماء عذب لكن بحيرتي آرال وقزوين واللتين تشكلان بحاراً مغلقة تحتويان على ماء مالح.

المساحة	الموقع	البحيرة
۲۰۲۲۰۰۰	بين إيران وروسيا	بحر قزوين
31371 297	بين كندا والولايات المتحدة	سُبيريو ر
7957950	شرق أفريقيا	فيكتوريا
۲۰۵۲۰ کم۲	روسيا	بحر آرال
۲۹۰۹۰ کم۲	بين كندا والولايات المتحدة	هورون
۲۱۰۸۰ کم۲	الولايات المتحدة	مىشىغان
۳۲۸۹۳ کم۲	شرق إفريقيا	تانغاتياكا

السعب والمروح

المناطق العشبية

تغطي السهب والمروج حوالي ربع الأراضي في الكرة الأرضية، وللسهب بقع من مساحات واسعة من الأعشاب التي يصل طولها إلى (٤,٥) م وشجيرات ملتفة الأغصان وشجيرات متأشبة (عديدة الشعب) وبعض الأشجار الصغيرة، ويُستفاد من المروج في إنتاج المزورعات كالقمح أو الكلا للمواشي التي ترعى، ويتراوح طول الأعشاب ما بين التي ترعى، ويتراوح طول الأعشاب ما بين



هل تعلم؟

أن أكبر حقل قمح موجود في "ألبرتا" في كندا، يغطي مساحة تبلغ (١٤٢) كم٢ وهي مساحة تعادل تقريباً (٢٠٠٠) مسلحباً لكرة القدمالأمريكية.

المراعي

تظهر المراعي المعشبة في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وجنوب أفريقيا وأستراليا في مناطق حيث لا تكفي مياه الأمطار لنمو الغابات لكن تكفي لمنع تحوّل هذه المناطق إلى أراض صحراوية.



الصيف في تلك الأراضي حار جداً والشتاء بارد جداً، وتنخفض درجة الحرارة في الشتاء في مروج أمريكا الشمالية إلى درجة التجمد وترتفع في الصيف لتصل إلى (٣٨) درجة مئوية، ويبلغ معدل هطول الأمطار ما بين (٥٠ - ١٠٠) سم في السنة.

العشب الجديد

يمكن لحريق الأعشاب الناشئ عن صواعق البرق القضاء على سوقها، لكن سرعان ما تنمو الأعشاب من جديد، فلا تصل النار إلى البراعم المتصلة بقاعدة الأوراق لأنها قريبة جداً من الأرض، ولا تأكلها الحيوانات عندما ترعى منها.



الأرنه

الأرز هو العشب الوحيد الذي ينمو في الماء ويعد الغذاء الرئيس لأكثر من نصف سكان العالم، وينمو ٩٠٪ من كمية الأرز في العالم في قارة آسيا وحدها.



كل شيء عن الأعشاب

هناك ، ، ، ، انوع مختلف من الأعشاب التي تنمو على الأرض؛ لمعظم هذه الأعشاب سوق مجوّفة كما لبعضها سوق صلبة كالذرة وقصب السكر؛ وتعدُّ الأعشاب من النباتات المزهرة والتي تلقح بواسطة الرياح التي تحمل غبار الطلع من زهرة لأخرى، لذا لا تحتاج أزهارها لأن تكون فاقعة الألوان لتجتذب الحشرات لحمل غبار الطلع.



أنواع المحاصيل

تم تطوير محاصيل الحبوب من قبل الإنسان من الأعشاب البرية التي تستخدم كغذاء لكلا الإنسان والحيوان؛ إليك هنا بعض الأمثلة:



الأشجار المقلوبة

لأشجار الحُميرة في أفريقيا أغصان ضخمة منتفخة تختزن الماء فيها ،وفي أعلى الأغصان فروع قصيرة غليظة تبدو وكأنها جذور النباتات، وقد تكون الأشجار المعمرة منها مجوّفة فتستخدم كمظلة موقف الباص أو كمنازل للسكن.



البقاء على قيد المياة

يُساعد لون جلد الحيوانات في السهب على حمايتها من الحيوانات المفترسة كما تساعد على اختفاء الحيوانات المفترسة نفسها بين الأعشاب، فمن الصعوبة رؤية الحيوانات المنقطة أو المخططة كالفهد الصياد والنمر من مسافة بعيدة وخاصة عندما تتحرك في الأماكن التي يصل إليها ضوء الشمس وفي الظل، كما يساعد لون الأسد الأسمر المصفر على الاختفاء بين الأعشاب الجافة الطويلة والتربص لفريسته.

خيارات الغذاء في السهب

تتغذى الحيوانات على اختلافها أنماطاً مختلفة من النباتات في السهب، فتتغذى الزرافات على أغصان الأشجار الطويلة، وتأكل حمير الوحش رؤوس الأعشاب، بينما يأكل الثيتل الأفريقي سوق العشب المتبقية، ويأكل الغزال الأعشاب الصغيرة النامية حديثاً.



السهب

تقع معظم السهب قرب خط الاستواء في أفريقيا وجنوب شرق آسيا والهند وفي استراليا وهي مناطق دافئة على مدار السنة، وقد تجف بعض السهب لأكثر من عشرة أشهر في السنة، مع معدل (٢٠) سم فقط من المطر سنوياً وتجف السهب الأخرى لمدة ثلاثة أشهر فقط مع معدل (١٢٠) سم من الأمطار.



الصعارى

ماهي الهمراد؟

الصحراء هي منطقة يصل معدل هطول المطر فيها إلى أقل من (٢٥) سم في السنة، ينمو فيها القليل من النباتات الحية؛ وفي بعض الصحارى قد لا يهطل المطر طوال السنة إلا خلال عاصفتين أو ثلاث عواصف فقط، لكنها تكفي لنمو الحبوب ونضجها محوّلة بعض المناطق إلى بساطٍ من الزهور الجميلة تدوم بضعة أيام.



مساحة الصحراء في الأرض

تغطي الصحراء حوالي ٢٠٪ من سطح الكرة الأرضية، وتتألف معظم الصحارى من صخور فقط، أو قد تكون مغطاة بالحجارة والحصى، بينما هناك فقط ١٥٪ من المناطق الصحراوية هي صحراء رملية.



أكثر الأراضي جفافأ

تعد صحراء "آتاكاما" في شمال تشيلي من أكثر الصحارى جفافاً على الكرة الأرضية ، لم تهطل الأمطار في مناطق فيها منذ (٤٠٠) سنة من عام ١٥٧٠ ـ ١٩٧١ ، ولم يسجّل هطول الأمطار إطلاقاً في المناطق الأخرى.

	أكبر الصعارى مساهة	
المساحة بالكيلو متر مربع	الموقع	اسم الصحراء
٨٤٠٠٠٠	شمال أفريقيا	الصحراء الكبرى
100	استر اليا	الصحراء الأسترالية
17	جنوب غرب آسيا	الصحراء العربية
1.8	آسيا الوسطى	صحراء غوبي
77	أمريكا الوسطى	صحراء باتاغونيا
07	جنوبي أفريقيا	صحراء كالاهاري
٤٥٠٠٠٠	آسيا الوسطى	صحراء تركستان
٣٢٠٠٠٠	الصين	صحراء تاكلا ماكان
٣١٠٠٠٠	بين الولايات المتحدة والمكسيك	صحراء سونوران
٣١٠٠٠٠	جنوب غرب أفريقيا	صحراء نامبييا

الصمراء الكبرى

تبلغ الصحراء الكبرى ثلث مساحة قارة أفريقيا وهي مساحة تعادل مساحة الولايات المتحدة الأمريكية رابع أكبر دولة في العالم، لم تكن هذه الأرض الصحراوية من قبل بل كانت مغطاة بالجليد منذ ملايين السنين وبالبحر والغابات والمروج.



ديناصورات الصمراء

عاشت الديناصورات في صحراء غوبي في آسيا في فترة من الفترات، وقد وجدت مستحاثات للبيوض والعظام وهياكل عظميَّة لديناصورات "تاربوسور باتار" الجبارة الضخمة.



وادي الموت

يعد وادي الموت الذي تبلغ درجة الحرارة فيه (٥٧) درجة مئوية من أحر المناطق في قارة أمريكا الشمالية؛ توفي هناك المنقبون عن الذهب عام ١٨٤٩ عندما نفذ منهم الطعام والماء وهم في طريقهم إلى حقول ذهب كاليفورنيا ولهذا أطلق على الوادي اسم وادي الموت.



العاصفة الرملية

"تاكلاماكان" هي إحدى أكثر الصحارى المليئة بالرمال، بمقدور العواصف الرملية تكنيس الرمال إلى علو يبلغ ارتفاعه ٣٠٤٨ متراً. وقد يكون الرمل الذي يهب مع الريح في الصحراء الكبرى شديداً جداً لدرجة أنه يمكنه إزالة الطلاء عن سيارة أو طائرة.



الكثبان المتمركة

الكثبان الرملية هي شبه تلال متحركة من الرمل، تهب الريح لتنتقل الرمال من جانب واحد من الكثيب وتسقط بعض الرمال فوق قمته لتنزلق إلى الجانب الآخر. وتزحف الرمال مسافة تتراوح ما بين (١٠) إلى (٥٠) متراً سنوياً وبمقدورها غمر قرى وواحات.



ثلج الصحراء

تغطي طبقة رقيقة من الثلج نبات الصبار تبلغ ثخانتها (٥ سم) في عدة صحارى من أمريكا الشمالية ويهطل الثلج على جبال "أهاجار" أيضاً في الصحراء الكبرى.



درجة المرارة

قد تنخفض درجة الحرارة في الليل في الصحراء الشديدة الحرارة تحت درجة التجمد إلى (-٤) بينما تصل درجة حرارة الرمل خلال فترة النهار إلى (+٧).



الصبار العملاقة

تنمو نباتات الصبار في صحارى القارة الأمريكية فقط، وقد يصل طول أطول نوع منها إلى ١٥ م وتزن ١٥ طناً ويمكن أن تعيش لمدة (٢٠٠) سنة، تختزن الماء في سوقها حيث تتغذى عليه في أوقات الجفاف.



الهماري الباردة والمارة

هناك عشر مناطق رئيسة صحراوية في الأرض، للصحراء الباردة صيف شديد الحرارة وشتاء بارد قياساً إليه؛ وتشتد الحرارة في الصحراء الحارة خلال النهار طوال أيام السنة. الصحارى الباردة هي صحراء جنوب غرب أمريكاالشمالية وغربها، وصحراء باتاغونيا، وصحراء باتاغونيا،

وصحراء تركستان وصحراء عوبي.
الصحارى الحارة: هي الصحراء الكبرى،
صحراء ناميبيا وكالاهاري والصحراء العربية
والصحراء الإيرانية وصحراء أتاكاما والصحراء
الأسترالية.

شاطئ البحر

خط امتداد السواحل في العالم

لو حسبنا طول امتداد السواحل جميعاً في العالم فسيكون طولها ما يعادل طول خط الإستواء مضروباً به (١٣) ، ويبلغ معدل طول امتداد مجموع السواحل باستثناء الخلجان الصغيرة والرؤوس حوالي (٠٤٠٠٥) كم.



وفرة من الهياكل



يتألف المرجان الذي يتكاثر في المياه المدارية الدافئة من البلايين من الهياكل العظمية لحيوانات بحرية بالغة في الصغر. ويتألف الحيد البحري الكبير من المرجان حيث يمتد في سلسلة من الجزر والحيدان البحرية يبلغ طول الساحل الجنوبي الشرقي الأسترالي وقد استغرق تكاثر هذا الحيد مدة (١٢) مليون سنة.

الكثبات الساملية

هل سمعت عزيزي القارئ عن الكثبان الساحلية على الساحلية؟ توجد الكثبان الساحلية على شواطئ المحيط الأطلسي في فرنسا، وقد يصل ارتفاعها إلى (٩١) متراً وهو ارتفاع مذهل موازنة مع الكثبان الساحلية التي لا يصل طولها عادة أكثر من (١٥) متراً.

وتزحف الكثبان مع هبوب الرياح ببطء نحو البر مسافة (٦) متر كل سنة، وقد تدفن هذه الكثبان الأبنية وحتى غابات بأسرها.



المناخ العاصف



تعادل قوة الأمواج المتلاطمة في الشتاء على شواطئ شمال المحيط الهادي قوة ارتطام سيارة بجدار سرعتها ١٤٥ كم في الساعة. وتتقاذف الأمواج العاصفة على الساحل الشرقي لقارة أمريكا الشمالية صخوراً تزن (٦١) كغ على ارتفاع (٢٨) م على سطح منارة الشاطئ.

المد الشاهق

على الشاطئ يرتفع البحر وينخفض مرتين في اليوم في مد عال ومنخفض للأمواج. ويتراوح الفرق بين الموج العالي والمنخفض ما بين (١٢) متراً على السواحل البريطانية وآلاسكا إلى (٣٠) سم فقط على ساحل خليج المكسيك، يرتفع أعظم مد على خليج "فندي" في شرقي كندا ارتفاع (١٦) م في حين يخلو البحر الأبيض المتوسط من الأمواج عالية المد.



هل تعلم؟

أن أعلى منحدر صخري بحري يقع على الساحل الشمالي لـ "مولوكاي" في هاواي حيث يبلغ ارتفاعه (١٠٠٥) طابق.



الرمال

تنشأ الرمال من حت الصخور المنجرف إلى البحر بواسطة الأنهار، أو قد تنشأ الرمال من المنحدرات الصخرية المتفتتة، و لبعض الشواطئ رمال صحراوية كشواطئ البحر الأبيض المتوسط؛ حيث انتقل الرمل بفعل الريح من الصحراء الكبرى، وهناك شواطئ ذات رمال متنوعة الألوان كشواطئ الحمم السوداء في "تاهيتي"، أما الشواطئ الأخرى فهي مزيج من الرمال الملونة المتألفة من أنواع عديدة من الصخور أو من حت المرجان أو القواقع البحرية وإليك بعض ألوان الرمال:

اللهون المنشأ

الحمم البركانية	الأسود
حجر الغرافيت ـ الحجر المعدني الغرافيت ـ الكوارتز	الرمادي
الغرافيت ـ الكوارتز	البني الفاتح ـ العسلي
الكوارتز	الأصفر
الميفا	الذهبي
حجر السيلان المراجد	الأحمر
الحجر المعدني	الزهري
المرجان - المحار البحرية - الكوارتز	الأبيض

مت الصخور



يتغير شكل السواحل بشكل مستمر؛ فعلى الشواطئ الصخرية ترتطم الأمواج على المنحدرات فتجرف الحجارة والحصى والرمال، وبهذا تحت الصخور مشكلة الخلجان والكهوف والأقواس، وقد يتقلص شكل القوس إلى شكل عمود كالعمود المسمى "رجل هوي الكبير" الذي يعلو جزر أوركني والذي يبلغ طوله (١٣٧) م، تبلغ قوة الأمواج كالمنشار الضخم الهائل الذي ينشر الصخر على سفح المنحدر لذا يتقلص المنحدر، وهذا ما حدث في مار ثافينيارد في مدينة ماساشيست في الولايات المتحدة إذ تم مدينة ماساشيسة في الولايات المتحدة إذ تم نقل المنارة عن الساحل ثلاث مرات بسبب تقريباً كل سنة.



سبخات التين الهندي

تنمو أشجار التين الهندي الضخمة في المياه العميقة على بعض الشواطئ في المناطق المدارية كما في منبع نهر الغانج في الهند، وتمتد بعض السبخات مسافة (٩٧) كم على البر، ويمكن أن يصل طول شجرة التين الهندي إلى (٢٥) متراً وهي ذات جذور طويلة تدعم الشجرة.



الشاطئ المتغير

يمكن أن يتغيّر مستوى مياه البحر على الشاطئ خلال مدة طويلة من الزمن، إذ انجرفت معظم الموانئ الرومانية القديمة حول البحر المتوسط كميناء قيسارية على سواحل فلسطين، وعلى العكس إذ تجد "رومني مارشز" القديم في مدينة "كنت" في إنكلترا هو الآن على البر على بعد ٣ كم من البحر.



البحر

تسونامي

يطلق اسم تسونامي خطأً على الأمواج العارمة، وهي بالتحديد أمواج هائلة تنشأ بسبب انفجار البراكين التي تحت الماء أو بسبب الزلازل، وقد قُذف أحد التسونامي من زلزال حيث استغرق أكثر من أربع ساعات ونصف لينتقل من مسافة ٢٢٠٠ كم من خندق أليوتين تحت شمال المحيط الهادي إلى هونولولو وسط المحيط وقد ضرب التسونامي الجزيرة بأمواج ارتفاعها أكثرمن (١٥) متراً.



MIL . HI

يحوي الماء المالح على أكثر من ٩٦٪ بالمائة من الماء الصافي و٣٪ بالمائة من الملح العادي كما يحوي على ٨٠ عنصراً ومنها الذهب، وهذه عناصر تسعة موجودة في الماء بكميات كبيرة: الكبريتات والمغنيزيوم والكالسيوم والبوتاسيوم والبيرون والبيرون.

الكوكب الأنررق

يغطي الماء المالح حوالي (٧٠) بالمائة من سطح الكرة الأرضية، وتقسم القارات والجزر هذا الماء إلى المحيط السهادي والحيط الأطلسي والمهندي والحيطات القطبية، لكن أربعة عيطات منها متصلة ببعضها ويعد المحيط الهادي أكبر المحيطات إذ تغطي مياهه ثلث سطح الكرة الأرضية، ولعل أبعد نقطتين يفصل بينهما ماء المحيطات هما بين باناما وماليزيا حيث يمتد المحيط الهادي بينهما مسافة حيث كم تقريباً أي ما يعادل نصف المسافة حول العالم.



هل تعلم؟

يمكن للصوت الإنتقال عبر الماء بسرعة تبلغ (١٥٠٧)م في الثانية ؟أي أسرع من انتقاله في الهواء بخمس مرات والذي تبلغ سرعته (٣٣١) م في الثانية.

شُرب ماء البحر

عندما يتجمد الماء المالح فإنه لا يكاد يحوي على الملح، وهكذا بمقدور هؤلاء الذين يعيشون في المناطق القطبية كالأسكيمو تذويب الثلج واستخدامه كماء للشرب.



مقائق مدهشة

إذا جُمع الملح من البحار ونُشر على سطح الكرة الأرضية غطّى هذا الملح سطح الأرض بطبقة تبلغ ثخانتها (١٥٢) متر.



الإبحار مع عقارب الساعة

يجري الماء في البحار باستمرار حول الأرض حيث يتدفق في تيارات هائلة كتدفق الأنهار في البحار، وقد يبلغ عرض التيارات (٨٠) كم وقد تبلغ سرعته (٦) كم في الساعة.



وتدور التيارات في نصف الكرة الجنوبي غالباً عكس عقارب الساعة، أما التيارات في النصف الشمالي فتدور مع عقارب الساعة. وقد أبحر كولومبس عام ١٤٩٢ من اسبانيا إلى جزر الأنديز الغربية حسب اتجاه تيارين هما: الكناري والإستوائي الشمالي.

المحيطات

۰۰ ۱۹۵۲ کم۲ ۲ ۰۰ عم

۲۳٤۸۱۰۰۰

۰۰۰ ۱۳۹۸ کم۲

الإسم المحيط الهادي المحيط الأطلسي المحيط الهندي المحيط المتجمد الشمالي

دفء آيسالمندي

ينبع التيار الدافئ "غالف ستريم" من الجهة الشرقية للبحر الكاريبي عبر المحيط الأطلسي مروراً بايسلاندة وصولاً إلى شمالي أوروبا، وتحمل الرياح التي تهب عبر "غالف ستريم" الدف، إلى "ريجافيك" في آيسلاندة في فصل الشتاء لتبقى دافئة أكثر من مدينة نيويورك في الولايات المتحدة التي تبعد (٣٨٦٢) كم جنوباً حيث تهب رياح من التيار البارد "لابرادور".

البمار المالحة

تختلف كمية الملح في مياه البحر من بحر لأخر وتبلغ كمية الملح في البحر الأحمر بمعدل ستة أضعاف الكمية الموجودة في بحر البلطيك في أوروبا.



الماء البارد والماء الحار

تختلف درجة حرارة سطح البحر من بحر لآخر وقد تكون التيارات المدارية الدافئة تحت (٣٠) درجة مئوية، ويمكن أن تصل درجة برودة التيارات الباردة إلى (٣٠) درجة مئوية. وفي شمال المحيط الأطلسي حيث يلتقي التيار الدافئ "غالف ستريم" مع التيار البارد "لابرادور" حيث الفرق بين التيارين (١٢) درجة مئوية.



البحار والمحيطات

يقسم المحيط إلى مناطق مختلفة: القسم الرئيس ويسمى باسم المحيط والأقسام الباقية على شكل بحار، تحيط البحار عادة بسواحل القارات والجزر إليك أكبر البحار في المحيطات:

مساحته بالكم ٢	اسم البحو	المحيط
٤٧٩	كورال	المحيط الهادي
77	جنوب الصين	المحيط الهادي
YV0	الكاريبي	الأطلسي
701	الأبيض المتوسط	الأطلسي
٤٥	الأحمر	الهندي
Y E	الخليج االعربي	الهندي
175	هو دسون باي	المحيط المتجمد الشمالي
79	بافن باي	المحيط المتجمد الشمالي

ما البحار

قيعان المحيطات

لا تكون قيعان المحيطات مسطحة بل تتألف من جبال وبراكين وأراض مستوية كما في اليابسة تماماً، وتتألف الأراضي المستوية من صخور صلبة أو مناطق مغطاة بطبقة من الرمل أو الطين أو الرسوبيات أو الرّدغة (راسب من الطين)، بالإضافة إلى بقايا البلايين من المخلوقات البحرية التي لا حصر لأنواعها، ويبلغ معدل ثخانة قعر طبقة القعر (٣٠) م، كما يبلغ معدل ثخانة قعر البحر المتوسط ٢٠٠٠م.



هل تعلم؟

كلما غصت في الأعماق كلما زاد الضغط أي ينزيد وزن الماء من فوقك، ويعادل الضغط تحت عمق (٩١٠٠) متر وزن كتلة (١) طن تضغط على طابع بريدي.



جبال تحت البحار

يحوي كل محيط على جبال وتؤلف جميعها سلاسل جبلية يبلغ طولها أكثر من (٦٠٠٠) كم، وعلى امتداد المحيط الهادي هناك ٢٤٠٠٠ جبل بحري يتراوح طول قممها من (٦١٠ - ١٨٢٩) م تحت سطح البحر وتبلغ الجبال البحرية الأخرى من الضخامة حيث تبرز من سطح البحر كسلاسل من الجزر وتعرض هذه الخريطة سلاسل الجبال تحت ماء المحيطات.



الظلام والنور

في المياه الموحلة البعيدة عن الشاطئ يصفو الماء لعمق خمسة عشرة متراً، بينما يكون الماء صافياً على عمق (١١٠) متراً وسط المحيط ويمكن أن يصل شيء من ضوء الشمس إلى عمق (٢٤٤) م، ويكون تحت هذا العمق في ظلام دامس دائم وبارد، وتصل درجة الحرارة في الأعماق إلى على مدار السنة.



أعمق رملة غوص

قام العلماء بالغوص بواسطة الغواصة الحديثة "تريست" إلى القرب من قاع المحيط إلى خندق "مريانا" أخفض نقطة على الأرض، يصل عمق النفق جنوب غرب "غوام" في المحيط الهادي إلى (١١٠٣٣) م تحت مستوى سطح البحر.



السمك المضيء

تعيش أنواع كثيرة من السمك على عمق من مياه المحيط المظلمة ذات أضواء خاصة بها تصنعها بكتيريا داخل جسم السمكة، وهي بكتريا نشيطة دائماً لكن للسمكة قدرة على التحكم بالإنارة، ولسمكة الضفادع حوجلة من ضوء البكتريا في نهاية شوكة طويلة لها معلقة أعلى فم السمكة، يجذب النور المنبعث الأسماك الأخرى فيلتهمها سمك الضفادع.



مقائق مدهشة

تعيش حيّات هائلة طولها ٣م وسرطانات بحرية عمياء وأسماك البطلينوس العملاقة البيضاء على عمق (٢٤٠٠)م في الظلام الدامس في الحيط الهادي بالقرب من ساحل قارة أمريكا الجنوبية؛ وهي موجودة بالقرب من شق على قاع الحيط حيث تندفع منه المياه الغنية بالمعادن والتي تزودها بالغذاء اللازم لها.



	أرقام الغوص القياسية	
أعمق نقطة ١٠٥ أمتار ١٣٣ متراً ١٧٦ متراً ٩٢٣ متراً	غوص حبس النفس غوص بجهاز التنفس غوص بخوذة الغوص بغواصة كروية الغوص بالغواصة الحديثة "ترايست"	ie 3 Ilse on the second

مياة الأسماك في الأعماق

تعيش أحياء نباتية وحيوانية في أعماق مختلفة في المحيطات؛ إذ تطفو بعضها على السطح، هناك البلايين من النباتات والحيوانات البالغة في الصغر التي تكثر حول السواحل وفي البحار المدارية وتسمى هذه الأحياء "الضلالة": تكون الأسماك التي تعيش بالقرب من السطح عادة زرقاء أو خضراء أو بنفسجية، يمكن أن تنمو النباتات حتى عمق (١٨٠) أمتار، وفي منطقة الأحفاش (وسط المحيط) على عمق (١٨٠)م تكون الأسماك فضية اللون أو فاتحة. وفي الأعماق المظلمة يكون لون الأسماك على الأغلب بنياً وأسود أوبنفسجياً، كما توجد أسماك القريديس الحمراء فاقعة اللون تعيش في الأعماق.



القطيان

المحيط المتجمدالشمالي

يعد المحيط المتجمد الشمالي المحيط الأصغر مساحة بين المحيطات الأربعة؛ إذ أن مساحته أقل من عُشر أكبر المحيطات مساحة المحيط الهادي.



لَكُ ذلك جليد

تتألف الطبقات القطبية الجليدية من (٢) بالمئة من كمية المياه في العالم، وإن ذاب هذا الجليد سير تفع مستوى سطح البحر حول العالم حوالي (٦٠) متراً وبالتالي ستنغمر معظم المناطق الساحلية بالماء بالإضافة إلى مدن كبيرة كمدينة لندن وطوكيو ونيويورك.



غرين لاند

حوالي (٨٥) بالمئة من غرين لاند مغطاة بطبقة من الجليد وهي تمتد من (٢٤٠) كم من الشرق الشمال إلى الجنوب و(١١٠) كم من الشرق إلى الغرب؛ ومساحتها أكبر من مساحة بريطانيا بسبع مرات ونصف ولا يستطيع سكان الجزيرة البالغ عددهم (٠٠٠٠) نسمة العيش إلا على السواحل.

نبات بطيء النمو

من غرائب النبات أنه يصل عمر نبات الحزاز (بهق الحجر) إلى ٤٥٠٠ سنة وقد استغرق آلاف السنين لينمو بمقدار (٢,٥) سم.



شمس منتهف الليل

عند دوران الأرض حول الشمس يكون أحد القطبين في مواجهة الشمس باستمرار؛ وهكذا للقطب الشمالي نهار دائم من منتصف آذار إلى منتصف إيلول، ثم يكون دور القطب الجنوبي في نهار دائم.



هل تعلم؟

أنه لايوجد أرض في القطب الشمالي بل هو عبارة عن جليد طاف، ففي عام ١٩٥٨ كانت الغواصة "ناتيلوس" الأمريكية أول مركبة تقطع منطقة المحيط القطبي مسافة (٢٩٤٥) كم وهي تسير تحت القطب الشمالي.



إحصائيات عن طبقة الجليد في غرين لاند

مساحة منطقة طبقة الجليد ، ١٤٧٩ ، ٠٠ ٢ كم٢ حجم الجليد ٢٨٠٠٠٠ كم٣

ثخانة الجليد من ١٠٦ كم

درجات الحرارة في تموز فوق ١٠ درجة منوية

كانون الأول - . ٥ درجة مئوية

المعدل العام لدرجات الحرارة -٢٠٠ درجة مئوية

إحصائيات المحيط المتجمد الشمالي

مساحة المنطقة الكلية ١٣٩٨٦٠٠٠ كم٢

مساحة منطقة الجليد الطافي ٢٠٠٠٠٠ كم٢

معدل عمق الماء ، ، ، ، ، م

در جـة حـرارة الماء في أبـرد -١٥ درجة مئوية حالة

تْخانة طبقة الجليد ٧,٤٣ - ٠,٦

القارة القطبية الجنوبية

يغطي الجليد عُشر سطح الكرة الأرضية تقريباً في مناطق متفرقة، وحوالي (٩٠) بالمئة من هذا الجليد كله موجود في القارة القطبية الجنوبية وغرين لاند، والعشرة بالمئة المتبقية موجودة على شكل جبال جليدية، وتبلغ مساحة الطبقة الجليدية في المنطقة القطبية الجنوبية (١,٥) من مساحة الولايات المتحدة، كما تبلغ كمية الجليد أكثر بتسع مرات من طبقة الجليد في غرين لاند.



الدائرة القطبية الجنوبية

البركان

هناك بركان ما يزال ثائراً في المنطقة القطبية الجنوبيَّة "ماونت إيربوس" في منطقة "ترانسا نتراكتك رينج" ويصل ارتفاعه إلى ٩٠٠ م وق الجليد، ومع ذلك فالأبخرة الصاعدة والرماد البركاني مغطاة بالثلوج.



الحياة الطبيعية في المنطقة القطية الجنوبية

تعیش حشرات يبلغ طول كل منها (۱۳) مم وهي المخلوقات الوحيدة التي تعيش باستمرار في المنطقة القطبية الجنوبية، وتعيش الحيوانات والنباتات البرية في البحار والجزر المحيطة بالساحل بما فيها الحوت الأزرق أكبر مخلوق على الأرض طوله (٣٠)م ووزنه (١٣٦) طن، تعيش حيوانات البطريق في الجزر ويعتقد العلماء أن البطريق "أديلي"يستدل على طريقه بالشمس ليعود إلى أعشاشه التي تبعد مسافة (٣٠٥٨)كم، يمكن للبطاريق قطع المسافة سباحة تحت الماء بسرعة تقدر به (٤٠) كم في الساعة.



مطاردة الفقمة

تقضى في القارة القطبية الشمالية أسراب الفقمة معظم أوقاتها تحت الماء إلا أنها تحتاج إلى الصعود لتنفس الهواء كل (٢٠) ثانية وعندما تكون البحار متجمدة تشق الفقمة حفر تنفس كبيرة عديدة في الجليد.

تطارد الدببة القطبية الفقمة إذ تنتظرها عند حفر التنفس فعندما تصعد الفقمة للتنفس سرعان ما يخطفها الدب القطبي.



إحصائيات القارة القطبية الجنوبية

٠٠٠٠٠٠١ کم٢ مساحة طبقة الجليد ۲۹۰۰۰۰۰ حجم طبقة الجليد من ۲-٤ کم

ثخانة طبقة الجليد

٠٠٠٠٠٠ کم٢ مساحة منطقة الجليد في شهر آذار ٠٠٠٠٠٠٠ کم٢ إيلول

معدل تخانة طبقة الجليد على البحر 25 . . ٥ درجة مئوية معدل در جة الحرارة الداخلية

- ۲۰ در جة مئوية معدل در جة الحرارة الساحلية

الجبال الجليدية والمناطق المتجمدة

التجمد

يغطي الجليد (١٠) بالمئة من سطح الكرة الأرضية وهي منطقة تعادل مساحتها قارة أمريكا الجنوبية ويحوي الجليد على ثلج يكفي لتغطية الكرة الأرضية بأكملها بطبقة ثخانتها (٣٠) متراً.



الجليد العميق

بلغ ارتفاع كتلة جليدية قد سجل قياسها . ما يعادل (٣٣٠)م في محطة "بيرد" في القارة القطبية الجنوبية، كانت معظم الكتل الأخرى يتراوح ارتفاعها ما بين (٩١٠٠٠) متراً.



الفلق

الفلق هو شق في الكتل الجليدية يمكن أن يصل عمقه إلى (٤٠)م، ولعل أجساد المتسلقين الذين سقطوا في فلق في كتلة "بوسون" على جبل "مون بلان" أحد قمم جبال الألب عام ١٨٢٠ حيث كان بقيت مفقودة حتى عام ١٨٦١ حيث كان الجليد قد ذاب فوصل إلى نهاية الكتلة الجليدية.


الجليد المتحرك

يزحف الجليد إلى سفح الجبال بمعدل(٢,٥ ـ ٦٠) سم يومياً، وتتحرك بعض الكتل الجليدية بسرعة أكبر حيث يوجد كتلتان جليدتان في غرين لاند تسير ٢٤ م في اليوم تسمى "كواريج" وتسير رنكس إسبرا مقدار (٢٨)م .



الكتل الجليدية المدارية

وجدت كتل جليدية وحقول ثلجية بالقرب من خط الإستواء على الجبال التي يبلغ ارتفاعها أكثر من (٢٠٠٠) متر، هناك كتلة جليدية بلغ ارتفاعها (٢١) م في فوهة جبل كيبو في "جبال كيليمانجارو" في تنزانيا.



الكتل الجليدية المنهمكة

تتحرك كتلة "جاكو بشافن اسبرا" الجليدية في غرين لاند حوالي (٧) كم كل سنة، وينهار كل يوم أكثر من (١٤٢) مليون طن من الجليد ويطفو على شكل (١٥٠٠) جبل جليدي أو نحو هذا كل سنة.

أكبر جبل جليدي

لعل أكبر جبل قد تم العثور عليه حتى الآن هو بالقرب من ساحل القطب الجنوبي فقد سجل طوله (٣٣٥) كم وعرضه (٩٧) كم وهو يغطى منطقة مساحتها (٣١٠٠٠) كم٢ وهي مساحة تعادل مساحة بلجيكا.

مقائق مدهشة

انجرف جبل جليدي من المنطقة مسافة ٠٠٠٠ كم تقريباً إلى منطقة بعيدة جنوباً نحو جزيرة برمودا، وقد انجرفت كتلة جليدية أخرى شمالاً مسافة (٥٥٠٠) كم تقريباً إلى منطقة ريودو جانيرو في البرازيل.



هل تعلم ؟

أنه على الأقل (٧٥) بالمئة من الماء العذب في الأرض هو على شكل ماء متجمد داخل الكتل الجليدية وهي كمية تعادل هطول مطر مستمر في جميع أنحاء المعمورة لمدة (٦٠) سنة.

العمق الخفيي

يطفو عُشر من الجبل الجليدي فقط على سطح البحر فإن كان ارتفاع الجبل (١٢٢) م فهذا يعني أن القسم السفلي منه ذو ارتفاع لايقل عن (١٠٩٨) تحت الماء.



أطوال الكتل الجليدية

طولها	موقعها	اسم الكتلة
010 کم	القارة القطبية الجنوبية	ممر لامبرت فيشر الجليدي
۸۱۶ کم	روسيا	كتلة نوفايا زمليا
۲۲۳ کم	القارة القطبية الجنوبية	ممر مجمع الجليد القطبي
۲۸۹ کم	القارة القطبية الجنوبية	ممر نيمرود لينوكس ـ كينغ آيس
137 کم	القارة القطبية الجنوبية	دينمان الجليدية
٥٢٢ کم	القارة القطبية الجنوبية	كتلة "بيردمور" الجليدية
٥٢٢ کم	القارة القطبية الجنوبية	كتلة ريكفري الجليدية
۲۰۰ کم	غرين لاند	w .
۱۹۳ کم	القارة القطبية الجنوبية	كتلة أنماند الجليدية

انتبه جبل الجليد

تبع الجمعية العالمية لخفر الجبال الجليدية جميع الجبال وتحذر السفن من أي خطر قد يحدق الجبال وتحذر السفن من أي خطر قد يحدق الباخرة الضخمة "تيتانك" عند اصطدامها بجبل الجليد في ليلة الرابع عشر من نيسان عام ١٩١٢، وكان قد غرق (١٤٩٠) شخصاً من أصل وكان قد غرق (١٤٩٠) شخصاً من أصل (٢٢٠١) مسافراً عما فيهم طاقم السفينة.



تزويد الصحراء بالماء

يتكوّن الجبل الجليدي من ماء عذب يمكن الإستفادة منه لتزويد المناطق الصحراوية بالماء، ويفكر العلماء بإنشاء قاطرات يمكنها جر الجبال الجليدية بمسافة تقدر به (٠٠٤) كم في اليوم، وقد تستغرق رحلة الجبل من القطب الجنوبي إلى غربي أستراليا حوالي القطب الجنوبي إلى غربي أستراليا حوالي تتراوح من (١٤٥ - ٠٠٠) يوماً إلى صحراء تتراوح من (١٤٥ - ٠٠٠) يوماً إلى صحراء أتاكاما في تشيلي، وسيذوب نصف جبل الجليد فقط في الطريق.



ارتفاعات جليدية

لعل أطول جبل جليدي قد عثر عليه هو بالقرب من غرب غرين لاند حيث ارتفاعه قد بلغ (١٦٧)م أي أطول بقليل من نصف ارتفاع برج "إيفل" في مدينة باريس في فرنسا.



جبال مليدية عمرها طويل

يدرس القمر الإصطناعي حياة الجبال الجليدية ويتابعها فقد تابع دراسة جبل "ترولتونغا" الجليدي في القارة القطبية الجنوبية لمدة (١١) سنة إلى أن تفتت إلى جبال صغيرة عديدة، ويمكن لجبال الجليد السير مسافة تصل أقصاها إلى (٢٥) كم في اليوم حيث يصل المعدل الكلي لسير الجبال الجليدية مسافة (٠٠٠٠)



1 Likib

المناطق المليئة بالزلازل

تنشط الزلازل تحت البحار كنشاطها على الأرض، وهناك تسعين بالمئة منها في "حلقة النار" التي تحيط بالمحيط الهادي، وكما تنشط الزلازل الأخرى على طول حزام "ألباين" الذي يمتد من إسبانيا إلى تركيا، ثم يمتد من هيمالايا إلى جنوب شرق آسيا.



تمثل الخطوط مناطق الزلازل الرئيسة.

الماغنيتيود

هي شدة الزلزال التي تقاس على مقياس ريختر، حيَّث تبدأ بالرقم (١) وبين كل رقم وآخر تزيد القوة عشرة أضعاف فالزلزال الذي تبلغ شدته ٧ماغنتيود هي بمقدار قوة قنبلة ذرية شدتها فيغاتون (١) و آحد، قد سجل أسوأ زلزال حتى الآن بقوة ٩٨٠٠



(١) الميغاتون: قوة انفجار تعادل قوة مليون طن من .TNT

مليون نرلزاك

يحدث كل سنة حوالي مليون زلزال فكل اهتزاز يحدث للقشرة الأرضية هو عبارة عن

معظم الزلازل ضعيفة جداً تسجل على مقياس الزلازل فقط الذي يقيس أدّق حركة في القشرة الأرضية، وينشط زلزال قوي كل أسبوعين وتسبب معظم الزلازل تحت البحار أضرارأ



خطر

يمكن للحيوانات كالكلاب والدجاج ـ كما يعتقد الناس ـ الشعور بالاهتزازات الخفيفة أو شمها وبالتالي تنبيه الناس من احتمال حدوث زلزال، ففي عام ١٩٧٥ في "هايشينغ" في الصين نجا الآلاف من الناس من زلزال لأنهم قد انتبهوا إلى الخطر قبل حدوثه بفضل الحيوانات .



ضربة في الماء

يمكن الشعور بهزات الزلزال في بعض الأحيان على بعد المئات من الكيلو مترات، فقد هاج الماء في برك السباحة في هاوتسون في الولايات المتحدة بسبب زلزال في المكسيك عام (١٩٨٥) حيث المسافة بينهما (١٩٨٥) كم.



أثرالهدمة

يستمر حدوث الزلزال عادة أقل من دقيقة واحدة، أما في "ليسبون" في البرتغال فقد استمر الزلزال مدة عشر دقائق وقد وصلت موجات الاهتزازات إلى أفريقيا.



منطقة الكوارث

تقع الصين على حزام الألباين للزلازل وقد سجل أسوأ رقم لحوادث الزلازل المميتة هناك، ففي عام ١٥٥٦ قتل زلزال (١٩٧٦) شخصاً في إقليم شانكسي، وفي عام (١٩٧٦) على في إقليم تاتنفشان قتل زلزال شدّته (٨,٢) على مقياس ريختر (٧٥٠٠٠) شخصاً.

هل تعلم؟

أنه يمكن لقوة الزلزال تحت البحر إثارة كتل ضخمة من الوحل والرمل، كما يمكن أن تسبب هذه الكتل تيارات شديدة جداً فتؤدي إلى تمزق كابلات تحت البحر فقد حدث أن تقطعت كابلات المواصلات المهاتفية تحت المحيط الأطلسي بعد زلزال "نيوفاوندلاند" عام ١٩٢٩.

نار! نار!

تندلع حرائق هائلة بعد وقوع الزلزال؛ فقد أدى زلزال عام ١٩٠٦ في "سان فرانسيسكو" في الولايات المتحدة الأمريكية إلى اندلاع الحرائق في الأبنية الخشبية للمدينة، كما سبب انفجار أنابيب المياه، واستمرت هذه الحرائق مدة ثلاثة أيام و نصف، وقد استغرق إعادة بناء المدينة مدة لاتقل عن تسع سنين متواصلة.



مقائق مدهشة

تتحرك الأرض كتحرك الأمواج في المحيط بسبب زلزال شديد جداً، في عام (١٩٦٤) استمر الزلزال في آلاسكا مدة ٧ دقائق وقد سبب اهتزازه حدوث شقوق هائلة في الأرض يصل عرض الواحد منها إلى (٩٠) سم وعمقها (١٢) م، ومالت معظم الأبنية وانزلقت تحو الشقوق.



قندائف صخرية

سبب الزلزال الذي وقع عام ١٩٧٠ على ساحل البيرو سقوط كتل من الحجارة والثلج على على الأرض من أعلى جبل "نيفادوس هاسكاران" وقد كان ارتفاع ركام الحجارة . . . ٤ م وسبب دفن مدينة "يانغي" تحت عشرة أمتار من الحجارة كما قتل على الأقل (. . .) شخصاً.



زلازل القرن العشرين

هذه هي أحد أشد الزلازل في هذا القرن التي تم قياسها على مقياس ريختر:

		_
شدته على مقياس ريختر	الموقع	التاريخ
۸,۹	ساحل كولومبيا	19.7
۸,٦	جامو دكشمير ـ الهند	19.7
٨,٦	فالباريسو - تشيلي	19.7
۸,٥	إقليم كانسو - الصين	197.
٨,٦	جزر فوكس ـ آلاسكا	1979
۸,۹	شمال هونشو ـ اليابان	1988
٨, ٤	ساحل البرتغال	1981
۸,٣	آسام - الهند	190.
۸,٥	ليبو ـ تشيلي	197.
۸,٥	برنس وليام ساوند ـ آلاسكا	1972

البراكين

المناطق الحارة

هناك أكثر من ٦٠٠ بركان نشيط على الأرض، يقع نصفها تقريباً في "حلقة النار" على الأرض وتحت البحر في المحيط الهادي، حيث تحوي أندونيسيا وحدها (١٦٠) بركاناً ناشطاً وتعد معظم الجزر عبارة عن براكين كجزر هاواي وآيسلاندة التي تحوي على أكثر من ٢٠٠ بركان ناشط.



المناطق الرئيسة للبراكين

أنهار من نار

الحمم هي عبارة عن صخر ذائب ملتهب تصل درجة حرارته إلى ١٢٠٠ درجة مئوية تدفقت الحمم من جبل "تولباتشيك" في "كامتشاتكا" "بننسولا" في روسيا عام ١٩٧٥ بسرعة (١٦٨) متراً في الثانية، وكذلك عندما ثار بركان "لاكي" في آيسلاندة عام ١٧٨٢ انقذفت الحمم الملتهبة (٦٥)كم نحو الأعلى.



انفجار البراكين

تثور البراكين بمعدل (٢٠ ـ ٣٠) بركاناً كل سنة، وتثور بعض البراكين باستمرار تقريباً كما في جزيرة سترومبولي التي تطلق شلالات من الرماد المتوهج في السماء كل (٢٠) دقيقة تقريباً، أما بقية البراكين فهي خامدة، وقد تبقى ساكنة لعشرات أومنات من السنين، ثار بركان ماونت إتنا" في "سيسلي" (١٥٠) مرة خلال الر (٢٥٠) سنة الأخيرة.



ماء مار

تسخن المياه الجوفية بواسطة الصخور الحارة في المناطق البركانية، يمكن للماء أن يفيض إلى السطح على شكل ينبوع حار، أو يتدفق عالياً في الهواء على شكل حمة وهي نبع فوّار من الماء الساخن والبخار. تحوي حديقة "يلوستون" في الولايات المتحدة الأمريكية على ينابيع حارة و(٠٠٠٠) حمّة حيث تثور الحمة القديمة "فيثفل" إلى ارتفاع (٤٠) م كل (٣٠ - ٩٠)



هل تعلم؟

أن أكبر البراكين الناشطة على الأرض هو بركان "مونالوا" في هاواي؛ إذ يبلغ ارتفاعه (٤١٦٨) م وقد استمر ثورانه في إحدى المرات مدة سنة ونصف.



نفق من الحمم البركانية

قد تصل ثخانة سيول الحمم البركانية إلى ٢٠ م وقد تستغرق سنين عديدة لتبرد، ويتشكل داخل بعضها قنوات هائلة ارتفاعها عشرة أمتار تتعلق من سقوفها حمم حارة على شكل راشحات مقطرة علوية، تتقطر على أرض النفق مشكلة مترشحات من الحمم البركانية.



كراكاتوا

أعلى صوت سجّل حتى الآن كان انفجار بركان نسف جزيرة "كراكاتوا" بالقرب من جافا عام ١٨٨٣، وقد سُمع صوت الانفجار في استراليا من مسافة (٤٨٠٠) كم، كما كان للصدمة العنيفة أثر على مدينة كاليفورنيا في الولايات المتحدة المتي تبعد مسافة (٥٠٠) كم من تلك الجزيرة، وقد انقذفت الصخور والنار نحو الأعلى بارتفاع (٨٠) كم في الجو، وحملت الريح الرماد البركاني حول الأرض مسبة حالة غروب للشمس وصلت الى سماء لندن في انكلترا، كانت موجات الى سماء لندن في انكلترا، كانت موجات فدمرّت الأرض مسافة (١٦) كم على جافا فدمرّت الأرض مسافة (١٦) كم على جافا وسومطرة مسبة قتل (٣٦٠٠٠) شخص.



الغيوم المتوهجة

يطلق البركان غيوماً من الرماد البركاني بالإضافة إلى الجمر الذي يخالطه الرماد والغازات والحمم، وتسيل غيوم الرماد إلى أسفل التلة بمعدل (٢٠٠) كم في الساعة أو قد تتهادى مرتفعة نحو الأعلى.

عندما ثار بركان "مايون" في الفليبين عام ١٩٦٨ انقذف الرماد وحجارة من الحمم مسافة (٦٠٠) م عالياً في الجو وقد ارتفعت غيوم من الرماد إلى (١٠) كم.



الكتل الجليدية الميتة

تقذف بعض الانفجارت البركانية كتلاً مميتة من الطين، هذا ما حدث في بركان "نيفادا ديل رويز" في كولومبيا عام ١٩٨٥ ذوّبت الحرارة الجليد والثلج على القمة، وهذا سبب سيلاً من الوحل والماء فدمر مدينة أرميرو خلال خمس دقائق وقتل (٢٠٠٠٠) شخص.

العيش في خطر دائم

يمكن لطبقة من الرماد البركاني تغطية منطقة ريفية عند انفجار البركان، لكن الرماد البركاني يجعل التربة خصبة جداً، لذلك يجازف الناس بخطر العيش بالقرب من البركان الناشط للاستفادة منه، إذ يمكن أن تنتج ثلاثة محاصيل من الأرز كل سنة على منحدرات "غانغ أغونغ" في بالي حيث انفجر بركان عام ١٩٦٣ وقتل في بالي حيث انفجر بركان عام ١٩٦٣ وقتل) شخص.



		بن الثائرة	البراك	
	ارتفاعه	اسم البركان	البلد	القارة
	۰٤٧٥٠	كلوتشفسكايا	روسيا	آسيا
	٠٢٥٢٠	نيراغونغو	زائير	إفريقيا
Y	٠٤٢٧٠	ماي ورنغيل	آلاسكا	أمريكا الشمالية
	٧٧١٢٦	أنتوفالا	الأرجنتين	أمريكا الجنوبية
	۰۲۷۲	إيربيوس	جزيرة روس	القطبية الجنوبية
	7797	راوبيهو	نيوزلاندة	أوقيانوسيا
	٠٤٣٠م	إتنا	سیسیلي	أوروبا

المصادر الطبيعية

ما هي المهادر الطبيعية هل ستنف

تزودنا معظم المصادر الطبيعية كالبترول والفحم والغاز المستخرجة من باطن الأرض بالنور والحرارة، كما يتم الحصول على الحطب وفحمه من الأشجار، وتنقل المياه الحارة الأبخرة من باطن الأرض بواسطة الأنابيب. ويستفاد من قوة الماء والأنهار الجارية ومن سرعة الرياح في توليد الطاقة الكهربائية، كما تخزن الطاقة الشمسية في صفائح وخلايا لتستخدم في تسخين الماء والتزود بالكهرباء أيضاً.

هل ستنفذ المهادر الطبيعية يوماً ما؟

سيأتي يوم تنفد فيه مخزونات الأرض من الوقود المستحاثي أي البترول والفحم والغاز التي قد تشكلت منذ ملايين السنين، وفي هذه الحالة نحن نستهلك هذا الوقود في الوقت الحاضر يومياً، ويعتقد العلماء أنه في خلال سبعين سنة سيكون البترول والغاز قد استهلك كله، وخلال ثلاثمائة عام سيكون الفحم قد استهلك من الأرض، ولكن قد يكون هناك المزيد من الوقود في باطن الأرض أو تحت البحر في مناطق لم يتم الكشف عنها بعد.



مخزون الفحم

حفرت مناجم الفحم في عهد الرومان منذ القرن الأول الميلادي، إلا أنه ما يزال هناك كمية ضخمة من الفحم تحت الأرض، وأكبر مخزون من الفحم في العالم تملكه روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين وألمانيا الغربية والمملكة المتحدة وبولندة واستراليا.





هل تعلم؟

عزيزي القارئ ـ أنه فقط ٥٪ بالمئة من عدد سكان العالم يعيشون في الولايات المتحدة الأمريكية لكنهم يستهلكون حوالي (٢٩) بالمئة من البنزين وحوالي ٣٣ بالمئة من الكهرباء المستهلكة في العالم.



طاقة جريات النهر

تستخدم قوة جريان ماء الأنهار والشلالات لتوليد حوالي ربع الطاقة الكهربائية في العالم، وهذه بعض البلاد التي تعتمد على الماء في توليد الكهرباء:

البلد نسبة اعتمادها على الطاقة المائية

النروج	7.1
البرازيل	1.98
سو يسرا	1.19
کندا	%.v •
إيطاليا	%.0.
فرنسا	%.0.
اليابان	/. ~ .
ألمانيا الغربية	/. r ·
الولايات المتحدة الأمريكية	/. Y ·
روسيا	% Y.



منتجات من بقايا المستعاثات

تصنع معظم المنتوجات من الفحم والبترول وإليك هذه الأمثلة البسيطة منها:

المنتوجات المصنّعة من الفحم:

- البلاستيك
 - ـ العطور
 - ـ غاز الفحم
- أراضي الشوارع والطرقات



منتوجات من البترول

- ـ الكاز
- ـ البنزين
- ـ وقود الديزيل
- ـ شمع البارفين
- ـ مواد صيدلانية طبية
 - ـ مواد المتفجرات
- مواد المبيدات (الذباب و الطحالب)
 - مواد المنظفات بأنواعها
 - ـ مواد التجميل
 - ـ المواد اللاصقة
 - المواد الملمعة
 - ـ مواد الطلاء
 - ـ النايلون
 - ـ اللدائن



الماء المغلي

ينقل الماء المغلي من باطن الأرض في آيسلاندة ليُستعمل في تدفئة البيوت والمصانع وفي أحواض السباحة في المسابح العامة، وهكذا تزود العاصمة ريكجافيك بـ (٢٥٠) ليتر من الماء المغلى كل ثانية.



مصفاة البتروك

يستخرج عشرون بالمئة من البترول في العالم من آبار بالقرب من البحر، يمكن أن تنتج مضخة بترول واحدة على البحر الشمالي كمية من البترول تصل إلى (٣٢٠٠٠) ليتر يومياً، وبمعدل ٥٥ ليتر لكل سيارة تملأ هذه الكمية (٥٨٠٠) سيارة.



الاستفادة من أشعة الشمس

تختزن السخانات الشمسية على أسطح البيوت الحرارة من الشمس، وكثير من البيوت في فلسطين وكندا واليابان تستخدم السخانات الشمسية؛ وعقدور السخانات التي تبلغ مساحتها ٣م تسخين (٢٢٦) ليتر من الماء يومياً وهي كمية تكفي للاستحمام مرتين ولاستخدامها في كافة أنواع الغسيل في المنزل.



مصادر الطاقة

المصادر الطبيعية الرئيسة للطاقة المستخدمة اليوم هي:

	نسبة كميتها	مصدر الطاقة
00000	7.49	البترو ل
00000	% Y Y	الفحم
600000	7.17	الغاز
	117	الخشب كوقود/الفحم النباتي
	7.7	قوة الماء الهيدرولية
	رض	المصادر الأخرى كالحرارة من باطن الأ وينابيع الماء الحارة
	7.1	الطاقة الذرية

الصخور والمعادن وأشباه المعادن

الصخور في القشرة الأرضية

تتألف القشرة الأرضية من أنواع مختلفة من الصخور، وهي تنتمي جميعاً إلى صخور ثلاث من أصل واحد تسمّى: البركانية والرسوبية والمتحولة وإليك ـ عزيزي القارئ ـ بعض الأمثلة عن أنواع تلك الصخور:

الصخور البركانية:

وهي التي تشكلت من الصخور الحارّة الذائبة داخل باطن الأرض العميق بين صخور سطح الأرض.



الهخور الرسوبية:

عبارة عن طبقات تتشكل من كتل منحَّتة من الصخور وقد تحوي على بقايا النباتات والحيوانات.



الهخور المتعولة:

تتشكل هذه الصخور من صخور سطح الأرض التي تحولت بفعل الحرارة والضغط إلى صخور من نوع آخر.



الأمجار المتلألئة

هناك حوالي (١٠٠) شبه معدن تعدمن الأحجار الكريمة لأنها جميلة ونادرة كالماس والياقوت من أثمن المجوهرات لأنها من أكثر الأنواع ندرة.



العناصر

تتألف الصخور من خليط من معدن أو أكثر، وتتكون المعادن من عناصر كيميائية، وهذه قائمة بالعناصر الكيميائية التي توجد بكميات كبيرة في القشرة الأرضية:

النسبة المئوب	اسم العنصر
٤٦,٦٠	الأوكسجين
TV, VT	السيليكون
٨,١٣	الألمنيوم
0	الحديد
٣, ٦٢	كالسيوم
7, 17	صوديوم
7,09	بوتاسيوم
۲, ۰ ۹	مغنزيوم
٠,٠٤٤	التيتانيوم
٠,٠١٤	هيدروجين
.,.17	الفوسفور
.,.0	الكبريت
٠,٠٤	الكلورين
٠,١	الكربون
لتضمنة	العناصر الأخرى وا
٠,٤١	الذهب والفضة

المنقبون عن الذهب

على عمال المناجم اليوم حفر (٢ طن) من صخور لإيجاد (٢٨) غراماً فقط من الذهب، ولو فرشت كمية الـ (٥٠) طناً من الصخور من منجم جنوب أفريقيا وحده، لغطى جزيرة مانهاتان ومدينة نيويورك بطبقة عمقها (٢.٤) متر.



أشياه المعادت

تتألف صخور القشرة الأرضية من خليط من أكثر من ٢٠٠٠ شبه معدن، لكن تتكون القشرة الأرضية من (٢٠) نوعاً من أشباه المعادن فقط كالميغا والكوارتز وهذه مجموعة من بعض الاستخدامات لأشباه المعادن:



استخداماته	شبه المعدن
في القلم الرصاصي	الغرانيت
الطبشورة المدرسي	الجص
الزجاج - المرايا	السيليكا
الأسمدة	الصوديوم
	والبوتاسيوم
معجون الأسنان	الفلوريت
الملونات الزرقاء	الكوبالت
ملح الطعام المنزلي	كلور الصوديوم
	100



عراقة الفنون المعدنية

استخرجت معظم المعادن من صخور القشرة الأرضية كالفضة والقصدير والزئبق والحديد والرصاص منذ آلاف السنين ففي الشرق الأوسط منذ (٨٠٠٠) سنة كان يستخدم النحاس والذهب كمجوهرات وحلي للزينة، وقد صنع وجه بعض الفراعنة أمثال توت عنخ آمون من الذهب منذ ٢٠٠٠ سنة.



مقائق مدهشة

حجر الخفاف هو حجر بركاني ملي، بالثقوب والفقاعات وهو خفيف جداً لدرجة أنه يطفو على سطح الماء ويعد هذا الحجر الوحيد الذي يطفو بين بقية أنواع الأحجار.



هل تعلم؟



هل تعلم - عزيزي القارئ - أن أشباه المعادن تصنف حسب درجة قساوتها على مدرج من (١) إلى (١٠) ودرجة الطلق وهو الذي يستعمل بشكل "ذرور" هي (١) ويصنف الماس من الدرجة (١٠) فهو من أقسى المعادن على الأرض، إذ لا يقطع حجر الماس أو يلمعه إلا حجر منه فقط.

بريق الماس

يوجد الماس في الطبيعة بألوان قوس قزح: الأبيض والأصفر والزهري والأخضر والأزرق والبني والأحمر والأسود، وتبدو أحجار الماس في الأرض على شكل حصى مدوّرة باهتة ولا يظهر بريقها إلا عند تشكليها وتلميعها، وأما الأنواع الأخرى من الماس الصغيرة الحجم والملونة بألوان داكنة فهي تستخدم لقطع الأدوات.



العالم والتطور


الناس على الأرض

في الأرض كمية محدودة من البترول والفحم والخشب والتربة ويستخدم الناس هذه المصادر الطبيعية بنسبة مزعجة كما يسببون تشويه منظر الأرض وتلوث الماء والهواء وهذا يؤدي إلى تغيير حالة الأرض في المستقبل.



تلوث الماء

تتخلص المعامل من النفايات الكيميائية فترميها في البحر أو تلقيها في البحيرات والأنهار حيث تقتل الأسماك والنباتات البحرية، ويعد البحر الأبيض المتوسط من أكثر البحار تلوثاً على الأرض، وفي بعض المناطق بقع تغطي سطح المياه بطبقة رقيقة من البترول المتسرب من السفن وهكذا لم يعد البحر بهذه الحالة صحياً للساحة فه.



أراضي المحاصيل

تم قلع الأشجار الكبيرة والشجيرات لتشكيل حقول كبيرة، فقد بلغت مساحة حقل واحد من حقول الذرة وسط غرب أمريكا (٨١٠ هكتار) ويساعد كبر مساحة الحقل على سهولة الزرع والحصاد؛ إلا أن إعادة زراعة المحصول نفسه كل سنة يقلل من خصوبة التربة وتقل كمية المحصول كل سنة كما يمكن للأوبئة والحشرات الضارة أن تقضي على محاصيل كاملة في الحقول.



الهماري

تزداد مساحة الصحراء في العالم ممتدة إلى الأراضي الزراعية من أطرافها بسبب زحف الكثبان الرملية، ويبلغ توسع الصحراء الكبرى وحدها بمعدل (٠,٨) كم كل شهر.



الناخ المتقلب



يعتقد بعض العلماء أن احتراق الفحم والبترول والغابات الاستوائية يؤدي إلى تغير المناخ فقد ترداد حرارة الكرة الأرضية بمقدار (٧) درجات مئوية على القطبين مما يسبب ذوبان بعض الجليد وبالتالي يرتفع مستوى سطح البحر ليصل إلى (٧) أمتار مغطياً جميع الموانئ، ويعتقد علماء آخرون أن غبار احتراق الفحم والبترول والخشب قد يحجب أشعة الشمس وقد تصير الأرض أكثر برودة وقد تغطي كمية كبيرة من الجليد نصف الكرة الشمالي لتصل على لأقل إلى لندن في إنكلترا.



الأراضي الزراعية

تصلح فقط (١١) ٪ من الأراضي للزراعة ؛ لكن كل سنة تقل مساحة الأرض المستخدمة لتنمية المحاصيل الزراعية ولرعي المواشي وذلك أن التربة تنجرف مع مياه الأمطار أو تنزاح مع الريح.

في الشلاثينات من القرن العشرين حرث الفلاحون في جنوب غربي أمريكا الأرض لتحضيرها لزراعة القمح إلا أنه حوالي (٢٥) سم من التربة قد أزاحته الرياح تاركة الأرض على شكل وعاء من الغبار حيث لا يمكن للنبات النمو.



هل تعلم ؟

هل تعلم أنه في كل سنة تقطع الأشجار بكميات كبيرة لدرجة أنها يمكن أن تغطي مساحة مدينة كبيرة كمدينة برمنغهام في إنكلترا على شكل كومة كبيرة من الأخشاب علوها علو بناء مؤلف من عشرة طوابق.



ازدمام كبير

يسبب الدخان الأسود الذي تنفثه السيارات والمركبات تلوث الهواء في الجو، ولوحظ أن أكثر من ثلث غابة ألمانيا السوداء تضمحل بسبب تأثير ذلك الدخان، كما يُغطي سماء مدن كبيرة مثل لوس أنجلوس في الولايات المتحدة وطوكيو في اليابان طبقة كثيفة من الدخان الخانق الذي قد سببه دخان السيارات.



التعدين

تسبب عملية التعدين أي استخراج المعادن من الأرض كالبوكسيت (الذي يستخرج منه الألمينيوم) تدمير مساحات واسعة من الأرض كما تسبب تلوث البيئة وتلقى في ماليزيا بقايا تعدين النحاس في الأنهار مما يسبب تسمم الأسماك.



الغاية المتلاشية

تغطي الغابات أكثر من ربع الكرة الأرضية إلا أنه تقطع أشجار الغابات أو تتلف في كل سنة المساحة تعادل إنكلترا واسكوتلندة وويلز وبحلول عام (٢٠٠٠) سيكون قد قضي على ثلث الغابات الاستوائية.



المطر المؤكسد

تسبب المعامل ومحطات توليد الطاقة التي تحرق البترول والفحم غازات سامة ومواد كيميائية ضارة في الجو؛ ثم تتحد هذه المواد مع ماء المطر والثلج وتسقط إلى مسافة تبعد مئات الكيلو مترات مدمرة الغابات كما تقتل أنواع الحياة جميعها، وقد قتل التلوث الناجم عن مصانع بريطانية والمحول مع الرياح الأسماك والنباتات في نسبة التلوث في كندا سببها المصانع في الولايات المتحدة الأمريكية.



مستقبل الأرض

الناس على الأرض

ساهم الناس على مر العصور بتغيرات كبيرة للأرض، إلا أن معظم هذه التغيرات ضارة، يهتم الناس الآن بالتربة محاولين تحسينها وبالنفايات محاولين إعادة تصنيعها، كما يبذلون أقصى جهودهم لوقف تلوث الجو والماء



تسوية الأرض

تجرف الأمطار الغزيرة التربة من المنحدرات الجبلية، لذا تُبنى المدرجات وتسوّى الأرض لإعادة التربة وهكذا يمكن زراعة المحاصيل الزراعية فيها، وفي "بالي" تسوّى مدرجات لزراعة محاصيل الأرز التي تنتج ثلاثة محاصيل كل سنة.



التطهير والتعقيم

مقدور الإنسان بمساعدة المعدات والتقنيات الحديثة تنظيف البحيرات والأنهار الملوثة؛ إذ تُرود محطات توليد الطاقة بالمصافي المرشحة التي تزيل بعضاً من الغازات السامة المتصاعدة إلى الجو، أو تعالج بعض الغازات فتحول إلى مواد مرشحة، وبهذا عاد السمك ليسبح في نهر التايمز أحد أقذر الأنهار في أوروبا وذلك بفضل معالجة الأقذار كيميائياً لئلا تسبب أضراراً للنهر.



التملم بالأوبئة

في مناطق من الصين يُستخدم البط عوضاً عن المبيدات الحشرية للتخلص من الحشرات الضارة في حقول الأرز، في منطقة "الرمل الكبير" تأكل الآلاف من البط حوالي ٢٠٠ حشرة كل ساعة، ولهذا النظام ميزة أخرى إذ أن المبيدات الحشرية تنجرف مع الأمطار من الحقول لتصبها في البحيرات والأنهار حيث يتلوث الماء، أما هذه الطريقة فهي طريقة طبيعية ليس فيها أي ضرر على الطبيعة.



الحفاظ على المياه

لعل طريقة رش المحاصيل بالماء في المناطق الجافة هي طريقة تهدر الماء فقد يضيع قسم كبير منه بالتبخر، يمكن توفير كميات كبيرة من الماء عن طريق سقاية المزروعات بكميات محدودة قليلة من المياه المارة خلال أنابيب بلاستيكية مثقوبة وفي فلسطين يتحكم الحاسوب بعملية السقاية متى يجريها ومتى يوقفها ومتى يرش المزروعات بالرذاذا رشاً.



زراعة الريح

يمكن توليد الكهرباء من طواحين الرياح بدلاً من محطات توليد الطاقة التي تستهلك البترول أو الفحم؛ وهكذا تتم زراعة الحقول بطواحين هواء بمقدورها تزويد ٨٪ من كهرباء مدينة كليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية في غضون عام ٢٠٠٠، وتزود مزرعة تحوي على على بالكهرباء.



العناية بالتربة

يمكن جعل التربة أكثر خصوبة عن طريق زرع محاصيل متنوعة في آن واحد بدلاً من زرع نوع واحد فقط؛ ففي "جاوا" تزرع صفوف متبادلة من الأناناس والبازلاء، وبهذا يحافظ على خصوبة التربة.



غرس الأشجار

يزرع المزيد من الأشجار لتزويدنا بالأخشاب من أجل التجارة والوقود للتدفئة والطهي، تستخدم في كوريا الجنوبية معظم الأخشاب كوقود، وقد تم زراعة ٧٠٪ من الأراضي بالشجيرات، كما يزرع في الهند في "كوجارات" أطفال المدرسة شتلات أشجار لتزويد البلاد بالخشب المستخدم كوقود للتدفئة والطهى.



إعادة تصنيع القمامة

يمكن تصنيف نفايات القمامة وإعادة تصنيعها من جديد، تصنع أكثر من نصف العلب المعدنية الخاصة بالشراب في الولايات المتحدة الأمريكية حيث تذاب ويعاد تصنيعها.

وفي بريطانيا يعاد تصنيع القوارير حيث تصنف كل حسب لونها ثم تصهر في الأفران ويعاد استخدامها.



زراعة الهمراء

يمكن وقف توسع الصحارى عن طريق غرس شجيرات على أطراف الكثيب الرملي لمنع زحفه، ويمكن أن يستفاد من هذه الشجيرات أيضاً إذ تنتج شجيرة "الجوجوبا" شمعاً سائلاً ويمكن أن تنتج شجيرة "الغويول" ونوع من "الطرخشفون" عصارة النبات التي تستعمل في صناعة المطاط.



تونير الفحم والبترول

يعدُ استخدام نفايات القمامة من الوسائل التي توفر من استهلاك الفحم والبترول، في إدمنتون في إنكلترا تولد الطاقة الكهربائية عن طريق حرق حوالي ٢٪ من قمامة بريطانيا كلها موفرة بذلك حوالي (١٠٠٠٠) طن من الفحم كل سنة.



الحفاظ على الأشجار

يمكن توفير حوالي ٣٥ مليون شجرة كل سنة وذلك إذا أعيد تصنيع ٧٥٪ من الورق المستعمل والكرتون وتحويله إلى عجينة ورق جديدة لتستعمل في صنع ورق جديد.




هل تعلم؟

أنه بمعدل ربع السيارات في البرازيل تسير على وقود مستخرج من قصب السكر، بينما تستخدم نصف السيارات في جنوب أفريقيا وقوداً مصنوعاً من الفحم السائل.



خريطة العالم





الأرض في يضد كلمات

هو بركان أنتوفالا في الأرجنتين

ارتفاعه (٦١٢٧) متراً.

أعلى

١- جبل في الكرة الأرضية:

هو جبل كيا في هاواي يبلغ ارتفاعه من قاع البحر (١٠٠٢٣)

٥ ـ جرف صخري بحري:

٤ ـ بركان ناشط:

أميليهي بوينت في مولوكاي في هاواي يبلغ ارتفاعه (١٠٠٥)

٢ ـ جبل على الأرض:

جبل إيفرست بين نيبال وهضبة التيبت يبلغ ارتفاعه (٨٨٤٣)

٦- شلالات:

شلالات أنجل في فنزويلا يبلغ ارتفاعها (٩٧٩) متراً.

٣ جبل تحت البحر:

بالقرب من تونغاترينش، عند جزر تونغا ارتفاعه (۸۶۹۰)

٩ مد و جزر:

مترا.

٧- حمة ناشطة:

حمة سيرفس سيتمبوت في

حديقة يلوستون في الولايات

المتحدة الأمريكية يبلغ ارتفاعها وسطياً (١١٥) متراً.

٨ - تسونامي (الأمواج العالية):

إشيغاكي في اليابان تبلغ (٨٥)

في خليج فندي في نوفاسكوتيا في كندا يبلغ معدل ارتفاعه (٥٤,٥) متراً.

أطول....

• ١- سلسلة جبلية:

سلسلة جبال الأنديز في أمريكا الجنوبية طولها (٧٢٤٠) كم.

٤ ١- وادي عميق:

غراند كانيون على نهر الكولورادو في ولاية أريزونا، الولايات المتحدة الأمريكية.

١٣ - نهر جليدي:

١٢ - كهف:

بين لامبرت و ميلور في المنطقة القطبية الجنوبية.

حديقة كهف الماموث الوطني

في كينتوشي في الولايات

المتحدة الأمريكية يبلغ (٤٨٤)

١١- نهر:

نهر النيل في مصر طوله (٦٦٧٠) کم.

١٥ - زقاق بحري: زقاق نوردفيست في غرين

لاند طوله (۱۱۳)كم.

أكبر....

١٦- محيط:

١٩- خليج:

المحيط الهادى مساحته (۱٦٥٣٨٤٠٠٠) كم٢.

قارة آسيا مساحتها خليج المكسيك مساحته (۱٥٤٤٠٠٠) کم۲. (۱۲۰۰۱ کم۲.

۲۳- جزيرة:

٢٢ قارة:

بحر قزوین بین ایران وروسیا مساحته (۳۷۲۰۰۰) کم۲.

٠٠٠ بحر داخلي:

جزيرة غرين لاند مساحتها (۲۱۷۵۰۰۰) کم۲. ١٧- بحر:

بحر الكورال: (وهو جزء من المحيط الهادي) مساحته (٤٧٩٠٠٠) کم٢.

١٨- رأس:

رأس البنغال مساحته (۲۱۷۲۰۰۰) کم۲.

٤٢- صحواء: ۲۱- بحيرة:

الصحراء الكبرى شمال بحيرة سوبيرير بين كندا إفريقيا مساحتها والولايات المتحدة الأمريكية (۸٤٠٠٠٠) کم۲. مساحتها (۱۲۲۱۶) کم۲.

أعمق....

٥٧- ميط:

۲۲- بحيرة:

المحيط الهادي يبلغ معدل عمقه وسطياً (٠٠٠٤) م.

بحيرة بايكال في روسيا يبلغ

عمقها وسطياً (١٩٤٠)م.

٧٧ ـ مضيق بحري:

۲۸ وادي عميق:

يبلغ (۱۱۰۳۳) م.

وادي كولكا البيرو يبلغ البحر:

مضيق ماريانا في المحيط الهادي


(۳۲۲۳)م.

كهف كوفري جين يرنارد في فرنسا يبلغ (١٥٣٥)م.

۲۹ کهف:

٣٠ أرض تحت مستوى سطح

البحر الميت بين فلسطين والأردن يبلغ عمقه (٣٩٥) م.



	TATA TATA	
	جو الأرون	
9	خارج الأرض	8
9	- هل تعلم - الأوكسجين ـ الهواء الذي نتنفسه	
1	ـ تناقص الهواء بالإرتفاع ـ الإرتفاعات الجوية ـ الأمواج الترددية	6
1	- الطيران عالياً	0
11	ـ درجات حرارة الغلاف الجوي	
11	- حجاب الشمس	0
17	- الحادور - العيش في الأعالي	
17	- الأرض المرتفعة	
17	ـ متسلقات المنحدرات الصخرية	8
15	- أطول السلاسل الجبلية	
	- هل تعلم. - أعمار الجبال	0
	سعل التنبرا _ فجر المنطقة الشمالية	
10	- منظر من الطبيعة المبكرة	
		B

	JANJANJAN	
	ـ المروج المتجمدة	W
	ـ إحصائيات التندرا	D
	ـ أبرد من الثلج	
	ـ الحياة تحت الجليد	
	حقائق مدهشة	
	الجليد الدائم	
	ـ الثلاجة. مانينالاليان	
	ـ طنین الناموس۱۷۱۷۱۷	
	الغابات	
	ـ إحصائيات عن الغابات	
	ـ أشجار ضد النار	
	بعض أنواع أشجار الصنوبر	
66	عابات الصنوبر١٩	
	ـ تاجر الأخشاب	
	ـ الجذور العميقة٢٠	
	- مجموعة منتجات من أشجار الصنوبر	
Page 1	ـ أطول وأقدم وأكبر	
	ـ الغابات الاستوائية المدارية	
	ـ غابات بلا أشجار ً	
	18/18/18/18/18/18/18/18/18/18/18/18/18/1	B

	A PAID
*1	ـ الضفادع الطائرة
77 77 77	- النباتات المنتصبة
77	- حقائق مدهشة
7	- نباتات للمأوى - هل تعلم
7 m m m m m m m m m m m m m m m m m m m	المياه في الغابات الإستوائية
Y £	الأنهار والبحيرات ــــقطرة ماء
7 £	- أطول الأشجار بالنسبة للقارات - العيش على سطح الماء
70 70 70	- أكثر الشلالات ارتفاعاً
7°	الشلال المزدحم
77	- أكبر البحيرات والبحار السعب والمروح
YY	
	W/ W/

ZW.	TATIATIATIATI	
	_ المراعي _ كل شيء عن الأعشاب	
	ـ أنواع المحاصيل ـ العشب الجديد	
N	- الأرز	
	ر البقاء على قيد الحياة	
	_ السهب	
	الصحارى	
	ر مساحة الصحراء في الأرض الأرض هي الأرض ٣٠ ـــ أكثر الأراضي جفافاً	
	ـ أكبر الصحاري مساحةــــــــــــــــــــــــــــــــ	8
	ـ ديناصورات الصحراء	
	- وادي الموت	
	ـ الكثبان المتحركةـــــــــــــــــــــــــــــــــ	8
	ـ درجة الحرارةـــــــــــــــــــــــــــــــ	
	- الصحاري الباردة والحارةشاطئ البحر	
	ـ خط امتداد السواحل في العالم	
	ـ و فرة من الهياكل	
	ـ المناخ العاصف	
	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	

المد الشاهق	
هل تعلم	
سبخات التين الهندي	
حت الصخور	- (
البحر	
الكوكب الأزرق	
تسوناميالماء المالح	
شرب ماء البحر	-
حقائق مدهشة	-
المحيطات	
البحار المالحة. الماء البارد والماء الحار.	- 12
البحار وانحيطات	-
ما البحار قيعان المحيطات ٣٩	
هل تعلم	-
جبال تحت البحار	
حقائق مدهشة	
أعمق رحلة غوص	- 1
أرقام الغوص القياسية	
FU REED REED REED	

						SIL	AN	
3	٤١	 			الأعماق	سماك في	_ حياة الأم	NEW
	, ,				11	ti .	القطبان	
0					*		- المحيط المت - كل ذلك	
BI	٤٢	 					ـ غرين لان	
3						THE STATE OF THE S		M
	٤٣	 					ـ هل تعلم	O
						_	- إحصائيا - إحصائيا	
R	٤٣	 			نوبية	نطبية الج	ـ القارة الة	
							ـ البركان. ـ الحياة الع	
	٤٤	 				الفقمة	ـ مطاردة	D.
Co	٤٤	 	• • • • • • • •		ه القطبية ا المناطق ا			
	٤٥	 					ـ التجمد.	
	٤٥	 				مميق		
	٤٥	 			دارية	لحليدية الم	ـ الكتل الج	
							_	
								**
	*******	1				ع جسدیا	- ار ساف	
F/G)	MR	6 PK	36	DE	96	ME	96	P
						- Vall		

	- جبال جليدية عمرها طويل	
	ـ تزويد الصحراء بالماء	
	I Likyib	
2	ـ المناطق المليئة بالزلازل	
	الماغنيتيود	
	ـ مليون زلزال	
	ـ هل تعلم	
	ـ نار نار	
	- خطر	
	- ضربة في الماء	
	ـ قذائف صخرية	
	- حقائق مدهشة	
	- زلازل القرن العشرين	
	ـ المناطق الحارة	
	- أنهار من نار	
	- نفق من الحمم البركانية	
	- کرا کاتوا	
	ـ هل تعلم	
	ـ الغيوم المتوهجة	0
	- الكتل الجليدية المميتة	
1	- البراكين الثائرة	
	and the market was the same of	
	TOOR TOOR TOOR	P

	PANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDA	
	المصادر الطبيعية	
	ما هي المصادر الطبيعية ٤٥	D
	ـ مخزون الفحم	
	ـ هل ستنفد المصادر الطبيعية يوماً ما ٤٥	
	ے هل تعلم ٤٠	
3	منتجات من بقايا المستحاثات	
	_ طاقة جريان النهر	CONT.
1	ـ الماء المغلي ٥٦ ـ الاستفادة من أشعة الشمس ٥٦	
	مصادر الطاقة	
	الصخور والمعادن وأشباه المعادن.	
	_ الصخور في القشرة الأرضية٧٥	
	ـ الصخور البركانية	
2	الصخور الرسوبية٧٠	
	الصخور المتحولة٧٥	
	ـ المنقبون عن الذهب	
	- اللباه المعادل	OF
	ـ العناصر ٨٥	
	_ هل تعلم ٩٠	
	الم	
	الفنون المعدنية٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	
	_ حقائق مدهشة	
	العالم والتطور	
Tal	_ الناس على الأرض	
3	- الناس على الأرض	

7.	ر أراضي المحاصيل ــــــــــــــــــــــــــــــــــ	
77	- الأرآضي الزراعية - هل تعلم - الغاية المتلاشية - المطر المؤكسد	
77	- ازدحام كبير - التعدين مستقبل الأرمه	R
77	- الناس على الأرض. - تسوية الأرض. ك - التطهير والتعقيم. - التحكم بالأوبئة.	
75	ـ الحفاظ على المياه ـ زراعة الريح ـ العناية بالتربة	8
70	- غرس الأشجار - ترفير الفحم والبترول - الحفاظ على الأشجار - هل تعلم	
70	- إعادة تصنيع القمامة - زراعة الصحراء - خريطة العالم	
	الأراض في بضم كلمان - أعلى - أطول	
79	- أكبر - أعمق	
	WALL BOLL BOLL BOLL	

